

2013 Yeterlik Sınavı

1. Skuamöz hücreli karsinomun oral mukozada **en sık** yerleştiği lokalizasyonu işaretleyiniz.

Müköz membran hastalıkları (Zorluk derecesi: 1)

- A) Üst dudak
- B) Üst damak
- C) Alt dudak
- D) Alt damak
- E) Dil

2. Hailey-Hailey hastalığının klinik ayırıcı tanısı içerisinde **yer almayan** hastalığı işaretleyiniz.

Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 1)

- A) İnvers psoriasis
- B) Akrodermatitis enteropatika
- C) Diskeratozis konjenita
- D) Pemfigus vejetans
- E) Darier hastalığı

3. Piyoderma gangrenozum tanısı alan hastanın tedavisinde hangisi **yer almaz**?

Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 1)

- A) Yara örtüleri
- B) Cerrahi debridman
- C) Sistemik kortikosteroid
- D) Dapson
- E) Siklosporin

4. IVIG kullanımı hangisinin eksikliğinde **kontrendikedir**?

Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 1)

- A) Ig G
- B) Ig M
- C) Ig A
- D) Ig E
- E) Ig D

5. Behçet hastalığı tedavisinde **yer almayan** ilacı işaretleyiniz.

Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 1)

- A) Kolşisin
- B) Metotreksat
- C) Dapson
- D) Allopurinol**
- E) Talidomid

6. El-ayak-ağız hastalığı etkenini işaretleyiniz.

Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 1)

- A) Coxsackie virüs**
- B) Parvovirüs
- C) Epstein Barr virüs
- D) Human herpes virüs
- E) Cytomegalovirüs

7. Pemfigus vulgaris tedavisi için doğru ifadeyi işaretleyiniz.

Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Sistemik kortikosteroidler her koşulda ilk seçenektir**
- B) Azatioprin etkisini ilk birkaç günde gösteren hızlı etkili bir adjuvandır
- C) Metotreksat en sık kullanılan adjuvandır
- D) Fotoferez geniş serilerde etkinliği kanıtlanmış bir yöntemdir
- E) Plazmaferez adjuvan olarak ucuz ve güvenli bir seçenektir

8. Pemfigus formlarından hangisinde direkt immüno Floresan incelemede otoantikorlar hem intersellüler aralıkta, hem de bazal membran zonunda depolanmış olarak saptanır?

Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Pemfigus vulgaris
- B) Pemfigus vegetans
- C) Pemfigus foliaceus
- D) Paraneoplastik pemfigus**
- E) Pemfigus herpetiformis

9. Kutanöz layşmaniazis lezyonu için hangisi doğrudur?

Parazitik hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk derecesi: 2)

- A) En sık el ve ayak sırtına yerleşir
- B) Genellikle kenarı oyuk (dekole) ülser şeklindedir
- C) Ülser dönemine kadar belirti vermez
- D) Vektör sineğin ısırığını takiben 1 hafta içerisinde belirir
- E) Tipik olarak ağrısızdır

10. Stevens-Johnson Sendromu ile toksik epidermal nekrolizin ayrımında hangi bulgunun alan yüzdesi kullanılır?

İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 2)

- A) Epidermal ayrışma alanı
- B) Eritemli alan
- C) Purpurik makül görülen alan
- D) Mukozal erozyon
- E) Püstüllü alan

11. Pitriyazis rozea ile ilgili olarak **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Çocuk ve genç erişkin hastalığıdır
- B) Haberci lezyon hastaların çoğunda görülür
- C) Lezyonlar hastaların çoğunda kaşıntılıdır
- D) Hastalık sıklıkla ilk ve sonbaharda görülür
- E) Tedavide darband UVB kullanılabilir

12. Dermatofitlere bağlı gelişen id reaksiyonunun tanısı için hangisi doğrudur?

Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Dermatofit enfeksiyonu olmadan gelişebilir
- B) Dermatofit enfeksiyonu bulgu vermeden önce gelişir
- C) Enfeksiyon yerinden uzak lokalizasyonda gelişir
- D) Enfeksiyon ile aynı klinik bulgular gözlenir
- E) Antifungal tedaviyle kaybolmazlar

13. Lenfositoma kutis ile **en sık** birliktelik gösteren enfeksiyon etkeni hangisidir?

Kutanöz lenfoid hiperplazi, lenfomalar (Zorluk derecesi: 2)

- A) A grubu beta hemolitik streptokok

- B) Treponema pallidum
- C) Borrelia burgdorferi
- D) Neisseria gonorrhoea
- E) Mycobacterium tuberculosis

14. Hangisi yumuşak şankırın klinik bulgusu **değildir**?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Ülser eritemli ve tabanı indüredir
- B) Öpüşen ülserler gelişebilir
- C) Ülser ağrılıdır, birden fazla sayıda olabilir
- D) Sifiliz lezyonu ile birlikte görülebilir
- E) Ağrılı inguinal lenfadenopatiler vardır

15. Kuru (kentsel) tip deri layşmaniazisinin etkeni hangisidir?

Parazitik hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Leishmania tropica
- B) Leishmania infantum
- C) Leishmania major
- D) Leishmania donovani
- E) Leishmania mexicana

16. Horizontal gelişim fazı olmadan, de novo vertikal gelişim fazı göstererek tümör şeklinde ortaya çıkan melanom tipini işaretleyiniz.

Melanositik nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 2)

- A) Yüzeysel yayılan melanom
- B) Akral lentiginöz melanom
- C) Nodüler melanom
- D) Lentigo malign melanom
- E) Mukozal melanom

17. Nötrofilik ekrin hidradenitin **en sık** ilişkili olduğu durumu işaretleyiniz.

Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

- A) HIV enfeksiyonu
- B) Ülseratif kolit

- C) Behçet hastalığı
- D) Otoimmün tiroid hastalıkları
- E) Kemoterapötik ilaç kullanımı

18. Hangisi Grover hastalığının özelliği **değildir**?

Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Üst gövdede nonfolliküler papüloveziküler erüpsiyon
- B) Kaşıntı
- C) Fokal akantoliz
- D) Direkt immünofloresan pozitifliği
- E) Spontan iyileşme

19. Kaposi sarkomunda prognozu etkileyen **en önemli** faktör hangisidir?

Dermal ve subkutan tümörler (Zorluk derecesi: 2)

- A) Yaş
- B) Hastalık süresi
- C) Klinik tip
- D) Mukozal tutulum
- E) İmmünsüpresyon

20. Keloid tedavisinde **yeri olmayan** ajan hangisidir?

Dermal ve subkutan tümörler (Zorluk derecesi: 2)

- A) Kortikosteroid
- B) Kriyoterapi
- C) 5-fluorourasil
- D) Talidomid
- E) İnterferon

21. Güneş yanığına neden olan dalga boyunu (nm) işaretleyiniz.

Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 2)

- A) 100-280
- B) 280-320
- C) 320 -340
- D) 340-400

E) 400-760

22. *Mycobacterium tuberculosis*'e eksojen maruz kalım sonucu ortaya çıkan klinik tabloları işaretleyiniz.

Mikobakteriyal hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Lupus vulgaris- Skrofuloderma
- B) Tüberkülozis verrukoza kutis-Tüberküloz şankrı
- C) Liken skrofulozorum-Tüberkülozis verrukoza kutis
- D) Tüberküloz şankrı-Lupus vulgaris
- E) Skrofuloderma-Papülonekrotik tüberkülid

23. Vitiligonun kalıcı depigmentasyon tedavisinde kullanılan ajanı işaretleyiniz.

Pigmentasyon bozuklukları (Zorluk derecesi: 2)

- A) Monobenzon
- B) Kojik asit
- C) Azelaik asit
- D) Difensipron
- E) Takrolimus

24. Hangi prekanseröz lezyondan gelişen skuamöz hücreli karsinom **daha az** agresif seyreder?

Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 2)

- A) Aktinik keratoz
- B) Yanık skarı
- C) Radyoterapi alanı
- D) Kronik ülser
- E) Oral eroziv liken planus

25. Hangisi antimalaryal ilaçların yan etkisi **değildir**?

Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 2)

- A) Retinopati
- B) Hiperpigmentasyon
- C) Saçlarda beyazlama
- D) Gingival hiperplazi
- E) Hemoliz

26. Follikülit oluşumunu kolaylaştırıcı etkenler arasında **yer almayan** işaretleyiniz.

Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Atopik dermatit
- B) Psoriasis
- C) Diabetes mellitus
- D) Hiperhidroz
- E) Topikal kortikoterapi

27. *Carcinoma en cuirasse* adı verilen derideki sklerodermoid değişiklik **en sık** hangi kanserin deriye metastazı sonucu izlenir?

Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 2)

- A) Prostat kanseri
- B) Akciğer kanseri
- C) Renal hücreli kanser
- D) Meme kanseri
- E) Tiroid kanseri

28. Çocuklarda yaygın molluskum kontagiozumun **en sık** nedeni nedir?

Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 2)

- A) HIV
- B) Psoriasis
- C) Atopik dermatit
- D) Darier hastalığı
- E) Hailey Hailey disease

29. Stafilokokkal toksik şok sendromu için hangi bulgunun tanı değeri **yoktur**?

Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Kreatinin fosfokinaz düzeyinde artış
- B) Kan üre düzeyinde artış
- C) Biluribin düzeyinde artış
- D) Trombosit sayısında azalma
- E) Kan kültüründe üreme

30. Gebelikte kullanımı B kategorisinde olan topikal akne ajanlarını işaretleyiniz.

Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 2)

- A) Tretinoin ve tazaroten
- B) Benzoil peroksit ve azelaik asit
- C) Tazoreten ve tetrasiklin
- D) Eritromisin ve azelaik asit
- E) Adapalen ve benzoil peroksit

31. Melanositik lezyonlardan hangisi melanom gelişimi açısından risklidir ?

Melanositik nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 2)

- A) Halo nevus
- B) Becker nevus
- C) Unna nevus
- D) Rekürren nevus
- E) Nevus spilus

32. Liken sklerozun topikal tedavisinde ilk tercih hangisidir?

Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Kalsinörin inhibitörleri
- B) Potent kortikosteroidler
- C) Vitamin D analogları
- D) Testosteron
- E) Progesteron

33. Venöz ülserin klinik özelliklerinden **olmayanı** işaretleyiniz.

Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Medial malleolar yerleşim
- B) Hemosiderin birikimine bağlı pigmentasyon
- C) Variköz venler
- D) Parlak, atrofik deri ve kıl kaybı
- E) Düzensiz kenarlar

34. Bir hafta önce tiroidektomi yapılan 50 yaşında bayan hasta gövdede, kol ve bacaklarında aniden gelişen eritemli zeminde çok sayıda dağınık yerleşimli püstüler lezyonları nedeni ile acil servise başvurdu. Öyküsünden diz ve dirseklerinde ara ara eritemli skuamli papüllerin oluştuğu öğrenilen hastanın, muayenesinde ve laboratuvar tetkiklerinde ateş, lökositoz, eritrosit sedimentasyon yüksekliği mevcuttu. Bu hastanın tanısında ilk olarak hangisi düşünülmelidir?

Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 2)

- A) Subkorneal püstüler dermatoz
- B) İmpetigo kontagioza
- C) Akut generalize egzantematöz püstüloz
- D) Generalize püstüler psoriasis**
- E) Generalize mukokütanöz kandidiyazis

35. İktiyozis linearis sirkumfleksa, total IgE yüksekliği ile seyreden Netherton sendromunda izlenen yapısal saç anomalisini işaretleyiniz.

Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

- A) Moniletriks
- B) Trikostazis spinuloza
- C) Pili multigemini
- D) Pili psödoanulati
- E) Trikoreksis invaginata**

36. Sadece kız çocuklarında, Blaschko çizgileri boyunca eritem ve büllerin görüldüğü hastalığı işaretleyiniz.

Diğerleri (Zorluk derecesi: 2)

- A) Inkontinensia pigmenti**
- B) Goltz sendromu
- C) Child sendromu
- D) Nevoid telenjektazia
- E) Epidermolitik verrüköz epidermal nevüs

37. Topikal kortikosteroidlerden en güçlü sınıfta yer alanı işaretleyiniz.

Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 2)

- A) Prednikarbat %0.1
- B) Hidrokortizon butirat %0.1
- C) Klobetazol propiyonat %0.05**
- D) Triamsinolon asetonid %0.025
- E) Mometazon furoat %0.1

38. Retinoid X reseptörüne selektif olan retinoidi işaretleyiniz.

Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 2)

- A) İsoetretinoin
- B) Beksaroten**
- C) Asitretin
- D) Alitretinoin
- E) Etreinat

39. Hangisi alopesi areata için kötü prognoz göstergesi **değildir**?

Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

- A) Ailesel alopesi areata öyküsü
- B) Atopi öyküsü
- C) Başka otoimmün hastalıkların eşlik etmesi
- D) İleri yaşlarda başlangıç**
- E) Tırnak tutulumu

40. Hangisi sekonder lenfödem nedenleri arasında **yer almaz**?

Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Lenfoma
- B) Filariyazis
- C) Rozase
- D) Kriyofibrinojenemi**
- E) Obezite

41. Hangisi fibroblastlar tarafından **sentezlenmez**?

Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 2)

- A) Mukopolisakkarit
- B) Kollagen lif
- C) Elastik lif
- D) Keratin**
- E) Glikozaminoglikan

42. "Fiziksel ürtiker-stimulus ile lezyonların başlaması arasında geçen süre" eşleşmelerinden **yanlış** olanı işaretleyiniz.

Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 2)

- A) Akuajenik ürtiker - 5 dakika

- B) Soğuk ürtikeri - 10 dakika
- C) Kolinerjik ürtiker - 15 dakika
- D) Solar ürtiker - 5 saat
- E) Basınç ürtikeri - 6 saat

43. Retiküler yapıda pigmentasyon değişikliği **görülmeyen** dermatozu işaretleyiniz.

Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Eritema ab igne
- B) Kutis marmorata
- C) Diskeratozis konjenita
- D) Radyodermatit
- E) Eritema infeksiyozum

44. Bir yıl önce farkedilip takibi önerilen ancak gecikmeli olarak kontrole gelen, dilin alt yüzeyinde hafif büyüme gösteren 1,5cm çaplı, eritemli, keskin sınırlı, asemptomatik maküler lezyonu olan 65 yaşındaki erkek hastada ne yapılır?

Müköz membran hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Sifiliz serolojisi istenir
- B) Akciğer grafisi istenir
- C) Lezyondan biyopsi alınır
- D) Total cerrahi eksizyon için yönlendirilir
- E) Karbondioksit lazer tedavisi için yönlendirilir

45. İzole deri tutulumu olan bir sarkoidoz hastası için hangisi uygun bir tedavi seçeneği **değildir**?

Makrofaj ve monosit hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Potent topikal kortikosteroid
- B) Interferon alfa
- C) Hidroksiklorokin
- D) Metotreksat
- E) Topikal takrolimus

46. Mikst bağ dokusu hastalığında aşağıdaki hastalıklardan hangisinin belirtileri **bulunmaz**?

Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Sistemik lupus eritematozus
- B) Sistemik skleroz

- C) Lokalize skleroderma
- D) Dermatomyozit
- E) Polimiyozit

47. Septal pannikülit olan seçeneği işaretleyiniz.

Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Lupus pannikülit
- B) Pankreatik pannikülit
- C) Eritema induratum Bazin
- D) Eritema nodozum
- E) Lipodistrofik pannikülit

48. Hangisi ürtikeryal eritema multiformenin klinik özelliği **değildir**?

Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Bül görülmez
- B) Anüler eritemli plaklar görülür
- C) Tipik hedef benzeri lezyonlar vardır
- D) Mukoza tutulumu yoktur
- E) Kaşıntı sıktır

49. Seboreik dermatitin topikal tedavisinde hangi ajan **kullanılmaz**?

Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Salisilik asit
- B) Ketokonazol
- C) Difensipron
- D) Metronidazol
- E) Takrolimus

50. Anüler liken planus **en sık** hangi bölgede görülür?

Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Saçlı deri
- B) Bilek
- C) Sakral bölge
- D) Aksiller bölge

E) Popliteal bölge

51. Ara bezi dermatiti ile ilgili olarak **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Bakterilerin lokal pH'yı düşürmesi patogeneizde rol oynar
- B) Sekonder olarak *Candida albicans* la enfekte olabilir
- C) Fetal lipaz ve proteazlar patogeneizde rol oynar
- D) En sık 6-12 aylık bebeklerde görülür
- E) Jacquet dermatiti komplikasyon olarak görülebilir

52. Prozon fenomeni ile ilgili doğru ifadeyi işaretleyiniz.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Sifiliz tanısında kullanılan treponemal testlerin yaşam boyu pozitif kalmasıdır
- B) Otoimmün hastalıkların seyrinde saptanan yalancı sifiliz serolojisini belirtir
- C) Endemik treponemal enfeksiyonların ve boreliyozis seyrinde ortaya çıkar
- D) Yüksek titrede antikor varlığına bağlı yalancı negatif sifiliz serolojisini tanımlar
- E) HIV enfeksiyonu ile sifiliz birlikteliğinde gözlenen sifiliz serolojisinin özelliğidir

53. Hiperandrojenizmden şüphelenilen akne vulgarisli kadın hastada hormon profiline menstrüel siklusun kaçınıcı günlerinde bakılmalıdır?

Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Herhangi bir günde
- B) 1-5
- C) 6-10
- D) 11-14
- E) 15-28

54. Nekrobiyozis lipoidika ile ilgili **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

Endokrin, nutrisyonel ve metabolizma hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Keskin sınırlı, sert, ortası deprese plaklar ile karakterizedir
- B) Kadınlarda daha sık görülür
- C) En sık bacak ön yüzlerde yerleşir
- D) Kural olarak plaklarda ülserasyon görülmez
- E) Yüz, el içi, ayak tabanında görülebilir

55. Tinea kapitis süperfisyalis tedavisi için doğru ifadeleri işaretleyiniz.

- I. Bulaşma riskine karşı, hasta bir hafta okuldan alıkonmalıdır
- II. Tedaviye başlamadan önce enfekte saçlar epile edilmelidir.
- III. Sistemik tedavide ilk seçenek griseofulvindir.
- IV. Enflamasyona karşı tek doz sistemik steroid verilebilir.

Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

- A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

56. Tinea inkognitonun özellikleri ile ilgili ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz.

1. Dermatofit ve bakteriyel enfeksiyon birlikteliğidir
2. II. Aktif keskin sınır özelliği yoktur
3. Tinea korporis veya krurisin atipik seyirli şeklidir
4. Enfeksiyon çevreye çok yavaş olarak genişleme gösterir
5. Genellikle, potent topikal steroid uygulaması sonucu gelişir

Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

- A) I, III ve V
B) II, III ve IV
C) I, II ve IV
D) II, III ve V
E) I, IV ve V

57. Pigmente lezyonların tanısında **en uygun** biyopsi tekniği hangisidir?

Dermatolojik cerrahi ve foto(kemo)terapi (Zorluk derecesi: 3)

- A) Shave
B) Küretaj
C) Punch
D) İnsizyonel
E) Eksizyonel

58. "Cilalı tırnak" bulgusu hangi hastalıkta görülür?

Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Psoriasis vulgaris
- B) Atopik dermatit
- C) Liken planus
- D) Alopesi areata
- E) Kontakt dermatit

59. Hangisinde diffüz hiperpigmentasyon **beklenmez?**

Pigmentasyon bozuklukları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Addison Sendromu
- B) Nelson Sendromu
- C) Hipertiroidizm
- D) Diabetes mellitus
- E) Metastatik melanom

60. Sınırlı sistemik sklerozda (akroskleroz) **en sık** saptanan otoantikör hangisidir?

Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Anti U3 RNP
- B) Anti sentromer
- C) Romatoid faktör
- D) Soğuk aglutininleri
- E) Anti Scl70

61. Stafilokoksik soyulmuş deri sendromu (SSDS) ile ilgili doğru ifadeyi işaretleyiniz.

Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Nikolsky fenomeni negatiftir
- B) Avuç içi ve ayak tabanları tutulmaz
- C) Erişkinlerde prognoz daha iyidir
- D) Ayrılma dermo-epidermal bağlantı düzeyindedir
- E) Büllerden yapılan kültürlerde *Staphylococcus aureus* izole edilir

62. Erizipel benzeri id reaksiyonunun **en sık** yerleşim yeri hangisidir?

Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Yanaklar
- B) Gövde üst kısmı

- C) Bacak ön yüzü
- D) El parmak araları
- E) El ayası

63. Hangisi seboreik keratozun histopatolojik bulgusu **değildir**?

Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)

- A) Akantoz
- B) Papillomatoz
- C) Hiperkeratoz
- D) Yalancı keratin kistleri
- E) Parakeratoz

64. Kızıda rol oynayan toksini işaretleyiniz.

Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Eksfoliyatif toksinler
- B) Stafilokokkal enterotoksinler
- C) Toksik şok sendromu toksin-1
- D) Eritrojenik toksinler
- E) Letal toksin

65. Beş yaşında çocuk hastada yanaklarda kızarıklığı takiben aplastik kriz geliyor, en olası tanı nedir?

Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Eritema infeksiyozum
- B) Konjenital lupus eritematozus
- C) Ekzantem subitum
- D) Kızamık
- E) Kızamıkçık

66. Aktinomikoz tedavisinde ilk seçenek ilaç hangisidir?

Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Amfoterisin B
- B) Flukonazol
- C) Penisilin G
- D) Itrakonazol

E) 5- Flusitozin

67. Gebelik dönemine ait olmayan fizyolojik bulguyu işaretleyiniz

Diğerleri (Zorluk derecesi: 3)

- A) Linea nigra
- B) Piyojenik granulom
- C) Ekrin fonksiyonda azalma
- D) Gode bırakmayan ödem
- E) Gingival hiperplazi

68. Prurigo benzeri lezyonlar hangi otoimmün büllöz hastalıkta görülebilir?

Kaşıntı ve nörokutan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Pemfigus vulgaris
- B) Büllöz pemfigoid
- C) Müköz membran pemfigoidi
- D) Pemfigus eritematozus
- E) Lineer IgA dermatozu

69. Psoriasis ile birlikteliği sık görülmeyen hastalığı işaretleyiniz.

Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 3)

- A) Okluzif vasküler hastalıklar
- B) Crohn hastalığı
- C) Diabetes mellitus
- D) Atopik dermatit
- E) Ankilozan spondilit

70. Psoriatik tırnakta salmon lekeleri oluşumu tırnaktaki hangi patolojiye bağlıdır?

Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 3)

- A) Proksimal matriksin parakeratozu
- B) Tırnak yatağının tutulumu
- C) Artmış kapiller fragilite
- D) Distal tırnak yatağının parakeratozu
- E) Proksimal tırnak kıvrımının ventral yüzeyinin tutulumu

71. Skuamöz hücreli karsinom gelişme riski olan liken planus klinik alt tipini işaretleyiniz.

Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve dięer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Aktinik liken planus
- B) Hipertrofik liken planus**
- C) Atrofik liken planus
- D) Büllöz liken planus
- E) Liken pilanopilaris

72. Eritema nodozum ve tromboflebit birliktelięi **en sık** hangi durumda gözlenir?

Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Streptokokkal üst solunum yolu enfeksiyonları
- B) Sarkoidoz
- C) İnflamatuar barsak hastalığı
- D) Behçet hastalığı**
- E) Granulosit koloni stimule edici faktör alımı

73. Çocuk hastada güneşe maruziyetten 6 saat sonra deride yanma ve batma hissi ile başlayıp, 24 saat veya daha sonra kulaklar, burun, yanaklar, kolların ekstansör yüzleri ve el sırtlarında önce eritem ve ödem, sonrasında ise 2-4 mm çaplarında veziküller şeklinde ortaya çıkan ortası nekrotik ülserlere yol açıp skar bırakarak iyileşen fotodermatoz hangisidir?

Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Darier hastalığı
- B) Hidroa vaksiniforme**
- C) Eritropoietik protoporfirya
- D) Aktinik prurigo
- E) Berloque dermatiti

74. Dissemine ekzema **en sık** hangi tablo ile ilişkilidir?

Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Numuler dermatit
- B) Atopik dermatit
- C) Alerjik kontakt dermatit**
- D) İritan kontakt dermatit
- E) Asteotatik dermatit

75. Hangisi kütanöz T hücreli lenfoma **deęildir**?

Kutanöz lenfoid hiperplazi, lenfomalar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma
- B) Granülomatöz gevşek deri
- C) Aktinik retiküloid
- D) Woringer Kolopp hastalığı
- E) Sezary sendromu

76. Şiddetli alevlenme nedeniyle (başlangıç PASI skoru: 24) 300 mg/gün (5 mg/kg/gün) dozunda siklosporin başladığınız bir psoriasis hastasının bazal serum kreatinin değeri: 0.6 mg/dl'dir (normal:0.5-1.10 mg/dl). Hasta, tedavinin 1. ayında kontrole geldiğinde PASI skorunun 16, serum kreatinin değerinin 1.0 mg/dl olduğunu saptadınız. Siklosporin ile ilgili tedavi planı nasıl olur?

Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 3)

- A) Tamamen kesip, alternatif bir sistemik ajan planlanır
- B) Ara verip, 2 hafta sonra serum kreatinin değerine bakılır
- C) Aynı dozda devam edip, 2 hafta sonra serum kreatinin değerine bakılır
- D) 150 mg/gün dozuna düşer, 2 hafta sonra serum kreatinin değerine bakılır
- E) 225 mg/gün dozuna düşer, 2 hafta sonra serum kreatinin değerine bakılır

77. Histopatolojik açıdan granülomatöz **olmayan** hastalık hangisidir?

Makrofaj ve monosit hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Lupus pernio
- B) Piyoderma gangrenozum
- C) Layşmaniazis
- D) Romatoid nodül
- E) Nekrobiyozis lipoidika

78. Hangisi Nörofibrinomatosis Tip 2'nin ana özelliği **değildir**?

Genodermatozlar ve konjenital anormallikler (Zorluk derecesi: 3)

- A) Meningiom
- B) Schwannom
- C) Cafe-au-lait
- D) Spinal tümörler
- E) Lisch nodülü

79. Saçlı derideki kıl foliküllerinde **anagen faz süresi** ve **anagen fazdaki kıl folikülü oranları** ile ilgili yapılan eşleştirmelerden doğru olanı işaretleyiniz.

Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 3)

- A) Üç-altı ay, % 10-15
- B) Üç-altı ay, % 85-90
- C) Üç ay-üç yıl, % 85-90
- D) Üç-beş yıl, % 10-15
- E) Üç-beş yıl, % 85-90

80. DRESS Sendromu için **en önemli** mortalite nedeni hangisidir?

İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Sepsis
- B) Akut solunum yetmezliği
- C) Fulminan hepatit
- D) Akut böbrek yetmezliği
- E) Pankreatit

81. Hangisi kanserle ilişkili bir durum **değildir**?

Diğerleri (Zorluk derecesi: 4)

- A) Birt-Hogg- Dube sendromu
- B) Cowden sendromu
- C) Griscelli sendromu
- D) Vena cava superior sendromu
- E) Eritema giratum repens

82. Altmış yaşında erkek hasta, bir aydır vücudunda, günde yaklaşık 1 cm kadar genişleme göstererek yayılan, iç içe geçmiş halkalardan oluşan eritemli döküntüleri ile başvurdu. Hastanın öyküsünden son zamanlarda aşırı kilo kaybettiği ve bunun için tetkik edildiği öğrenildi. Alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde fokal parakeratoz, yama şeklinde spongioz, ve hafif perivasküler lenfositik infiltrat saptandı. Olası tanı ve eşlik eden hastalık nedir?

Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 4)

- A) Pankreas Ca- Nekrotik migratuvar eritem
- B) Akciğer Ca- Eritema giratum repens
- C) Akciğer Ca- Nekrotik migratuvar eritem
- D) Prostat Ca-Eritema giratum repens
- E) Prostat Ca- Nekrotik migratuvar eritem

83. Onbeş yaşında kız çocuk, yüz, göz kapakları, dudak, el ve ayaklarda ödem, karın ağrısı, kusma şikayeti ile acil servise başvurdu. Annesinde de zaman zaman benzer bulguların olduğu öğrenilen hastanın dermatolojik muayenesinde urtikeryal lezyonlar yoktu. Hastadan **ilk olarak** hangi tetkik istenir?

Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 4)

- A) C2
- B) C3
- C) C4
- D) C1 INH
- E) C1q

84. Kaşıntı ile ilgili **olmayan** nöropeptidi işaretleyiniz.

Kaşıntı ve nörokutan dermatozlar (Zorluk derecesi: 4)

- A) Vazoaktif intestinal peptid
- B) Kalsitonin gen ilişkili peptid
- C) P maddesi
- D) Beta interferon
- E) Nörokinin A

85. Kumadine bağlı gelişen deri nekrozunun patogenezi için doğruyu işaretleyiniz.

İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 4)

- A) İntolerans
- B) İdiyosenkrazi
- C) Geç tip aşırı duyarlılık
- D) Sekonder etki
- E) Yan etki

86. Klippel Trenaunay sendromunda **yer almayan** vasküler oluşum hangisidir?

Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)

- A) Lenfanjiektazi
- B) Nevus flammeus
- C) Nevus anemikus
- D) Venektazi
- E) Derin hemanjiom

87. Papüler ürtikerle ilgili **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

Parazitik hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk derecesi: 4)

- A) Lezyonlar grup yapar ve farklı renklerde olabilir
- B) Genellikle 2-10 yaş arası çocuklarda görülür
- C) Hedef benzeri lezyon görülebilir
- D) Diğer aile bireylerinde de benzer şikayetler olabilir
- E) Lezyonların iyileşmesi haftalar veya yıllar alabilir

88. Atopik dermatite benzeyen kronik ekzematöz dermatit, piyoderma veya süpüratif otitis media gibi yineleyen enfeksiyonların görüldüğü, trombositopeninin eşlik ettiği, erkeklerde görülen ve X'e bağlı geçiş tanımlanan durumu işaretleyiniz.

Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 4)

- A) Miyeloperoksidaz eksikliği
- B) Griscelli Sendromu
- C) Chediak Higashi Sendromu
- D) Kronik granüloamatöz hastalık
- E) Wiskott-Aldrich Sendromu

89. Antifosfolipid antikor sendromunda hangisi **görülmez**?

Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 4)

- A) Raynaud fenomeni
- B) Livedo retikularis
- C) Ülserasyon
- D) Sklerodermik plaklar
- E) Psödo-Kaposi sarkomu

90. Periungual skuamöz hücreli karsinom ile ilgili olarak **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz..

Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 4)

- A) Genital HPV'ler ile ilişkilidir
- B) Verrukayı taklit eder
- C) Metastaz riski yüksektir
- D) Rekürrens riski yüksektir
- E) İdeal tedavisi Mohs mikrocerrahisidir

91. Hangisi fotoyaşlanmanın klinik bulgularından **değildir**?

Lazer cerrahisi ve kozmetik dermatoloji (Zorluk derecesi: 4)

- A) Solar elastoz
- B) Kronik aktinik dermatit
- C) Ensenin kutis romboidalisi
- D) Civatte poikiloderması
- E) Kolloid milyum

92. Psoriatik artrit ile ilgili doğru ifadeyi işaretleyiniz.

Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 4)

- A) Psoriatik artrit için metakarpofalangeal eklem tutulumu tipiktir.
- B) Spondilit ve sakroileiti olan psoriasisli hastalarda periferik eklemler korunmuştur.
- C) Artritis mutilans; romatoid artrit ve psoriasis birlikte olan olgularda görülür.
- D) Asimetrik monoartiküler veya oligoartiküler tutulum en sık görülen psoriatik artrit formudur
- E) Psoriatik artritte romatoid artritin tersine sosis parmak görüntüsü ortaya çıkmaz.

93. Deri tutulumu **olmayan** porfiriya tipini işaretleyiniz.

Endokrin, nutrisyonel ve metabolizma hastalıkları (Zorluk derecesi: 4)

- A) Porfiriya kutanea tarda
- B) Eritropoietik protoporfiriya
- C) Akut intermittant porfiriya
- D) Herediter koproporfiriya
- E) Hepatoeritropoietik porfiriya

94. SCORTEN şiddet skorlamasında hangi parametre **kullanılmaz**?

İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 4)

- A) Hastanın yaşı
- B) Hipotansiyon
- C) Taşikardi
- D) Serum üre düzeyi
- E) Serum glukoz düzeyi

95. Evre 1b mikozis fungoides nedeniyle oral psoralen ve UVA (PUVA) tedavisi planladığınız tip II deriye sahip 70 kg'lık bir hastada tedavi planını işaretleyiniz.

Dermatolojik cerrahi ve foto(kemo)terapi (Zorluk derecesi: 4)

- A) 8-metoksipsoralen 40 mg, tedaviden 2 saat önce, 1 J/cm² UVA
- B) 5-metoksipsoralen 40 mg, tedaviden 1 saat önce, 1 J/cm² UVA
- C) 5-metoksipsoralen 80 mg, tedaviden 2 saat önce, 2 J/cm² UVA
- D) 8-metoksipsoralen 40 mg, tedaviden 2 saat önce, 2 J/cm² UVA
- E) 8-metoksipsoralen 80 mg, tedaviden 1 saat önce, 1.5 J/cm² UVA

96. BRAF mutasyonlarının **en sık** görüldüğü melanom tipini işaretleyiniz.

Melanositik nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 5)

- A) Yüzeysel yayılan melanom
- B) Akral lentiginöz melanom
- C) Lentigo malign melanom
- D) Nodüler melanom
- E) Mukozal melanom

97. Keratinosit hasarı sonrasında açığa çıkan proenflamatuar mediatörü işaretleyiniz.

Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 5)

- A) IL-10
- B) IFN-alfa
- C) GM-CSF
- D) IL-1
- E) ICAM

98. "Steroid sulfataz" enzim eksikliği ile seyreden iktiyozis tipini işaretleyiniz.

Genodermatozlar ve konjenital anormallikler (Zorluk derecesi: 5)

- A) İktiyozis vulgaris
- B) Lameller iktiyozis
- C) X'e bağlı iktiyozis
- D) Nonbüllöz konjenital iktiyoziform eritroderma
- E) Epidermolitik hiperkeratoz

99. HIV ile enfekte olduktan sonra morbiliform, papüloskuamöz ya da veziküler deri bulgularının da izlenebildiği akut retroviral sendrom (primer HIV enfeksiyonu) gelişene kadar geçen süre ne kadardır?

Parazitik hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk derecesi: 5)

- A) 1-2 hafta

- B) 3-6 hafta
- C) 3-4 ay
- D) 1 yıl
- E) 3-4 yıl

100. Elastosis perforans serpiginozaya **en sık** eşlik eden tabloyu işaretleyiniz.

Diğerleri (Zorluk derecesi: 5)

- A) Ehler-Danlos Sendromu
- B) Down Sendromu
- C) Marfan Sendromu
- D) Osteogenesis imperfekta
- E) Rothmund–Thomson Sendromu