

## 2014 Yeterlik Sınavı

1. Toksik şok sendromu için tanışal değeri olmayan belirtiyi işaretleyiniz.

*Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) 38.9 C derece ve üzeri ateş
- B) Hipotansiyon
- C) Eritematöz erüpsiyon
- D) Servikal lenfadenopati**
- E) Palmo-plantar deskuamasyon

2. Patch (yama) testini değerlendirdirirken hangi lezyon şüpheli reaksiyon olarak değerlendirilir?

*Dermatitler, ekzemalar, immunyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 1)*

- A) Eritemli zeminde veziküller
- B) Hafif maküler eritem**
- C) Eritemli zeminde papüller
- D) İnfiltrasyon ve papüllerle birlikte veziküller
- E) Yaygın büller

3. Primer müsinoz nedenini işaretleyiniz.

*Endokrin, nutrisyonel ve metabolizma hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Granuloma anulare
- B) Bazal hücreli karsinom**
- C) Lupus eritematozus
- D) Skleredema**
- E) Dermatomiyozit

4. Hangisi dekubit ülseri gelişiminde rol oynayan faktörlerden değildir?

*Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) İmmobilite**
- B) Duyu kaybı
- C) Dolaşım yetmezliği
- D) Derin ven trombozu**
- E) Yetersiz beslenme

**5.** Eritrazma ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Etken, Corynebacterium cinsi bir bakteridir
- II. Ayak parmak aralarında maserasyon ve erozyonla seyir gösterir
- III. Aksiller ve inguinal bölgede kahverengi yamalarla karakterizedir
- IV. Tablo, akut gürültülü seyirli olup oldukça kaşintılıdır

*Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** I, II ve III
- B)** I, IV
- C)** I, II ve IV
- D)** II, III
- E)** III, IV

**6.** Hangisi eritematelenjiyktatik tip rozasede tercih edilen bir lazer veya ışık tedavisi değildir?

*Lazer cerrahisi ve kozmetik dermatoloji (Zorluk derecesi: 1)*

- A)** KTP
- B)** Atımlı boyalı
- C)** IPL
- D)** Uzun atımlı Nd:Yag
- E)** Alexandrite

**7.** Atopik dermatitde görülmeyen bulguyu işaretleyiniz.

*Dermatitler, ekzemalar, immunyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 2)*

- A)** Palmoplantar hiperlinearite
- B)** Keilit
- C)** Pitriyazis alba
- D)** Milia
- E)** Prurigo nodularis

**8.** Antifosfolipid antikor sendromunda en sık izlenen hematolojik bulgu hangisidir?

*Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)*

- A)** Monositoz
- B)** Eozinofili
- C)** Trombositopeni
- D)** Retikülositoz

**E) Lökopeni**

**9.** En sık favus etkeni olan mikroorganizma hangisidir?

*Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) M.canis**
- B) T.schoenleinii**
- C) T.tonsurans**
- D) M.audouinii**
- E) T.violaceum**

**10.** Pemfigus formlarından hangisinde direkt immünofloresan incelemede otoantikorlar hem intersellüler aralıkta, hem de basal membran zonunda depolanmış olarak saptanır?

*Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Pemfigus vulgaris**
- B) Pemfigus vegetans**
- C) Pemfigus foliaseus**
- D) Paraneoplastik pemfigus**
- E) Pemfigus herpetiformis**

**11.** Bazal hücreli karsinomun klinik tipleri içinde yer almayan hangisidir?

*Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Kistik bazal hücreli karsinom**
- B) Yüzeyel bazal hücreli karsinom**
- C) Sikatrisel bazal hücreli karsinom**
- D) Vejetatif bazal hücreli karsinom**
- E) Pigmentli bazal hücreli karsinoma**

**12.** Löfgren sendromunun bileşenlerinden olmayan klinik bulguyu işaretleyiniz.

*Makrofaj ve monosit hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Poliartralji**
- B) Bilateral hiler lenfadenopati**
- C) Eritema multiforme**
- D) Üveit**
- E) Ateş**

**13.** Soliter mastositoma için doğru olan hangisidir?

*Dermal ve subkutan tümörler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) En sık saçlı deride yerlesir
- B) El içi ve ayak tabanı da sıklıkla hastalığa katılır
- C) Hastaların çoğu genç erişkinlerdir
- D) Dermatopatolojisinde iğ-hücre şeklindeki mast hücreleri görülür
- E) Spontan olarak gerileyebilir

**14.** Deri hastalıklarından hangisinde botulinum toksini tedavi seçenekleri arasında yer alabilir?

*Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Liken planus
- B) Atopik dermatit
- C) Pitriyazis rubra pilaris
- D) Hailey-Hailey hastalığı
- E) Dermatitis herpetiformis

**15.** Toksik epidermal nekrolisin histopatolojik bulguları için hangisi yanlıştır?

*İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Bazal tabakada apopitotik keratinositler
- B) Subepidermal ayrılma
- C) Perivasküler lenfositik infiltrat
- D) Epidermal püstüller ve spongioz
- E) Tüm epidermiste nekroz

**16.** Sweet sendromunda görülmeyen laboratuar bulgusunu işaretleyiniz.

*Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Lökositoz
- B) Sedimentasyon artışı
- C) Periferik yaymada sola kayma
- D) ANCA pozitifliği
- E) Eozinofili

**17.** Leprada sinir tutulumuna bağlı olarak beklenmeyen deri bulgusunu işaretleyiniz.

*Mikobakteriyal hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Ülserasyon**
- B) Hiperkeratoz**
- C) Bül**
- D) Pruritus**
- E) Anhidroz**

**18.** Liken simpleks kronikus ile ilgili doğru ifadeyi işaretleyiniz.

*Kaşıntı ve nörokutan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Sıklıkla altta yatan internal bir hastalık vardır**
- B) Okul çağında çocuklarında sık görülür**
- C) Lezyonlar sıklıkla yaygın nodüllerdir**
- D) El içi ve ayak tabanı tutulmaz**
- E) Sürekli kaşıma ile dermisde amiloid birikebilir**

**19.** Aşağıdakilerden hangisi akut generalize ekzantematóz püstülozusun, generalize püstüler psoriasisden ayırmada yardımcı değildir?

*İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Yüksek ateş varlığı**
- B) İlaç anamnesi sonrası akut başlangıç**
- C) Eritema multiforme benzeri lezyonlar**
- D) Dermatopatolojik incelemede vaskülit bulguları**
- E) Epidermisde nekrotik keratinositlerin varlığı**

**20.** Civatte poikiloderması hangisinin bir alt tipidir?

*Kutanöz lenfoid hiperplazi, lenfomalar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Liken planus**
- B) Psoriasis vulgaris**
- C) Mikozis fungoides**
- D) Dermatoheliozis**
- E) Dermatomiyozit**

**21.** Gövde ve ekstremitelerinde gelişen eritemli zemin üzerindeki büller nedeniyle başvuran yetmiş yaşındaki hasta sistemik problemleri için ilaçlar kullanmaktadır. Lezyonların ilaca bağlı geliştiği düşünündüğünde hangi ilaç değiştirilmelidir?

*Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Amiodaron
- B) Furosemid
- C) Parasetamol
- D) Azatioprin
- E) Eritromisin

**22.** Antifungal ajanlardan hangisi etkisini mantar hücre duvarının bütünlüğü için gerekli olan ergosterol sentezini inhibe ederek gösterir?

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Ketokonazol
- B) Nistatin
- C) Naftifin
- D) Amfoterisin B
- E) Terbinafin

**23.** Behçet hastalığı için doğru olmayan ifadeyi işaretleyiniz.

*Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Göz tutulumunda arka üveit ve retinal vaskülit önemlidir
- B) Eklem tutulumunda sıklıkla sakroiliak eklem ve aksiyel tutulum izlenir
- C) Gastrointestinal tutulum sıklıkla ileoçekal bölgeyi etkiler
- D) Vasküler tutulum en sık yüzeyel tromboflebit ve derin ven trombozu şeklindedir
- E) Nörolojik tutulum vasküler ve parankimal olarak iki şekilde ortaya çıkar

**24.** İnsan orf hastalığının en sık buluşma şeklini işaretleyiniz.

*Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) İnsandan insana temasla
- B) Kuzulardaki aktif lezyona doğrudan temasla
- C) İneklerin memelerindeki aktif lezyona doğrudan temasla
- D) İneklerin burunlarındaki aktif lezyona doğrudan temasla
- E) Hayvancılıkta kullanılan aletler aracılığıyla

**25.** Neonatal lupus eritematozus ile ilgili doğru ifadeyi işaretleyiniz.

*Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Lezyonlar ultraviyole maruziyeti sonucu oluşur

- B)** Gövde ve ekstremite tutulumu tipiktir
- C)** Olguların tümünde anti-Ro antikorları vardır
- D)** Lezyonların skar bırakarak iyileşmesi tipiktir
- E)** Sistemik belirtilere rastlanmaz

**26.** Eritromelalji için yanlış ifadeyi işaretleyiniz.

*Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Semptomlar genellikle epizodiktir
- B)** En sık üst ekstremite tutulumu görülür
- C)** En iyi bilinen bağlantılı bozukluk trombositemidir
- D)** Soğuk uygulaması ile semptomlar hafifler
- E)** Tedavide kalsiyum kanal blokerleri kullanılabilir

**27.** Dermatitis herpetiformisin en sık birlikte olduğu otoimmün hastalık hangisidir?

*Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)*

- A)** Vitiligo
- B)** Sjögren sendromu
- C)** Skleroderma
- D)** Hashimoto tiroiditi
- E)** Alopesi areata

**28.** İyatrojenik Kaposi sarkomunda en etkili tedavi yöntemi hangisidir?

*Dermal ve subkutan tümörler (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Sistemik vinblastin
- B)** Radyoterapi
- C)** Lazer tedavisi
- D)** İmmünsüpresif tedavinin kesilmesi
- E)** Eksizyon ve elektron demet tedavisi

**29.**

İntrensek atopik dermatitin özelliklerini işaretleyiniz.

- I. Erken yaşta başlangıç
- II. Belirgin kserozis
- III. Solunum yolu alerjisinin varlığı
- IV. Total IgE düzeyi normal olması

V. Alerjen spesifik IgE düzeyinin yüksek olması

*Dermatitler, ekzemalar, immunyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 4)*

- A) I-II-III
- B) I-II-IV**
- C) II-III-IV
- D) II-III-V
- E) III-IV-V

30. Hangisi dermatofitlere bağlı bir id reaksiyonu değildir?

*Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Folliküler papüller
- B) Eritema nodozum
- C) Eritema anulare sentrifigum
- D) Ürtiker**
- E) Eritema elevatum diutinum

31. Sifiliz tanısı alan hastalar ile teması olan kişilerin tedavisi nasıl olmalıdır?

*Cinsel yolla bulasan hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Benzatin penisilin G, i.m., 1.2 MÜ tek doz
- B) Benzatin penisilin G, i.m., 1.2 MÜ bir hafta ara ile 3 kez
- C) Benzatin penisilin G, i.m., 2.4 MÜ tek doz**
- D) Benzatin penisilin G, i.m., 2.4 MÜ bir hafta ara ile 2 kez
- E) Prokain penisilin G, i.m., 2.4 MÜ günde bir kez 10-14 gün

32. Kronik ülser tipi-uygun yara örtüsü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

*Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Yoğun eksudalı venöz Alginat
- B) Kötü kokulu venöz Kömür
- C) Arteriyel Hidrojel
- D) Kuru nekrotik nöropatik Hidrofiber**
- E) Evre II-III basınç köpük

33. Melanomada metastaz için en önemli risk faktörü hangisidir?

*Melanositik nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Tümör kalınlığı
- B)** Tümör çapı
- C)** Tümör lokalizasyonu
- D)** Tümörün nevüsden gelişmesi
- E)** Tümör yüzeyinde ülserasyon

**34.** Esansiyel mikst kriyoglobulinemi en sık hangi hastalıkla birlikte bulunur?

*Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Sistemik lupus eritematozus
- B)** Romatoid artrit
- C)** Sjögren sendromu
- D)** Hepatit C virüs enfeksiyonu
- E)** Lenfoproliferatif hastalıklar

**35.** Hangisi psoriazinin ortaya çıkışında tetikleyici faktör olarak rol oynamaz?

*Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 2)*

- A)** Streptokok enfeksiyonu
- B)** Beta bloker kullanımı
- C)** Mekanik travma
- D)** Hiperkalsemi
- E)** Ultraviyole

**36.** Klasik granuloma anularenin histopatolojik olarak yerleşim yeri neresidir?

*Makrofaj ve monosit hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Epidermal
- B)** Dermo-epidermal
- C)** Yüzeyel ve orta dermis
- D)** Dermo-subdermal
- E)** Subkutan

**37.** Kazanılmış melanositik nevusların klinik bulgularından hangisi tipik değildir ?

*Melanositik nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Genellikle doğumdan sonra ortaya çıkarlar
- B)** Yaşamın ileri yıllarında gerileyebilirler

- C) Açık tenli kişilerde koyu tenli olanlara göre daha sık görülürler
- D) Nevomelanositler hem epidermis hem de dermis içinde yerleşebilir
- E) Klinik olarak eleve lezyonlar genellikle daha koyu renklidir

**38.** Herpes zoster en sık hangi dermatomal bölgede yerlesir?

*Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Kranial
- B) Servikal
- C) Torakal
- D) Lumbar
- E) Sakral

**39.** Dishidrotik ekzema ile ilgili olarak doğru ifadeyi işaretleyiniz.

*Dermatitler, ekzemalar, immunyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) En sık görülen ter bezi hastalığıdır
- B) Hiperhidrozun kontrolü ile ekzemada düzelleme sağlanabilir
- C) Klinik olarak asemptomatik, yüzeyel yerleşimli veziküler gözlenir
- D) Tablonun şiddetlenmesinde sıcak havanın rolü yoktur
- E) Histopatolojisinde spongiotik dermatit ve ter kanalıyla ilgili veziküler gözlenir

**40.** Eritema multiformenin ayırcı tanısında aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmez?

*İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Fiks ilaç erupsiyonu
- B) Eritema anulare sentrifigum
- C) Subkutan lupus eritematozus
- D) Granuloma anulare
- E) Ürtikeral vaskülit

**41.** Hangisi gastrointestinal sistem kanamasına yol açan ve deri belirtileri görülen hastalıklardan biri değildir?

*Diğerleri (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Blue rubber bleb nevüs sendromu
- B) Psödoksantoma elastikum
- C) Henoch-Schönlein purpurası

- D)** Peutz Jeghers sendromu
- E)** Ülseratif kolit

**42.** Absorbe olabilen deri dikiş malzemesini işaretleyiniz.

*Dermatolojik cerrahi ve foto(kemo)terapi (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** İpek
- B)** Poliprolen
- C)** Polibutester
- D)** Poliyester
- E)** Polidioksanon

**43.** Yumuşak şankırın ayırcı tanısına **girmeyen** hastalığı işaretleyiniz.

*Cinsel yolla bulasılan hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Sifiliz
- B)** Behçet hastalığı
- C)** Herpes genitalis
- D)** Gonore
- E)** Travmatik ülserasyon

**44.** Etyolojisinde kalıtımın rol oynadığı ve gelişimsel anomalilerin eşlik ettiği figüre eritem hangisidir?

*Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 4)*

- A)** Eritema giratum perstans
- B)** Nekrolitik migratuar eritem
- C)** Eritema marginatum
- D)** Eritema kronikum migrans
- E)** Eritema giratum repens

**45.** Histopatolojik açıdan likenoid dermatit paterni **görülmeyen** hastalığı işaretleyiniz.

*Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoinmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 4)*

- A)** Fiks ilaç erüpsiyonu
- B)** Eritema multiforme
- C)** Lupus eritematozus
- D)** Pitriyazis rubra pilaris
- E)** Graft-versus-host hastalığı

**46.** Hangisi Harlequin fetusun klinik özelliklerinden değildir?

*Diğerleri (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Ektropion
- B) Eklabium
- C) Makrocefali
- D) Ellerde ödem
- E) Rudimenter kulak

**47.** Psoriasiform veya hiperkeratotik soliter plak şeklinde lezyonla karakterize, sıkılıkla akral yerleşim gösteren neoplastik T hücreli proliferasyon hangisidir?

*Kutanöz lenfoid hiperplazi, lenfomalar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Lenfomatoid papülozis
- B) Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma
- C) Natural killer hücreli lenfoma
- D) Pagetoid retikülozis
- E) Mikozis fungoides

**48.** Vitiligonun en sık görülen tipi hangisidir?

*Pigmentasyon bozuklukları (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Segmental
- B) Fokal
- C) Jeneralize
- D) Akrofasyal
- E) Universal

**49.** Hangisi Ataksi-teleniectazi sendromunun semptomları arasında değildir?

*Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Nevoid hiperpigmentasyon
- B) Erken saç beyazlaması
- C) Yüz derisinde atrofi
- D) Noninfeksiyöz kutanöz granülom
- E) Onikodistrofi

**50.** Deri ve mukozalarda solukluk, glossit, tekrarlayan aftalar, saçlarda erken ağarma ve geç başlangıçlı vitiligo hangi hastalıkla ile ilgili olabilir?

*Diğerleri (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Demir eksikliği anemisi
- B) Fanconi aplastik anemisi
- C) Pernisiyöz anemi
- D) Orak hücreli anemi
- E) Polisitemiya vera

**51.** *Staphylococcus aureus*'un ardışık yerleşimli kıl foliküllerini ve subkutan yağ dokusunu etkileyerek oluşturduğu enfeksiyon hangisidir?

*Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Sikozis
- B) Furonkül
- C) Karbonkül
- D) Follikülitis keloidalis
- E) Nekrozitan fasiitis

**52.** Köbner fenomeni perforan dermatozlardan hangisinde en sık gözlenir?

*Diğerleri (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Elastosis perforans serpiginosa
- B) Reaktif perforan kollajenoz
- C) Kyrle hastalığı
- D) Perforan kollajenoz
- E) Keratoelastoidozis marjinatum

**53.** Porfirya kutanea tarda için yanlış ifadeyi işaretleyiniz.

*Endokrin, nutrisyonel ve metabolizma hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) En sık görülen porfirya tipidir
- B) Bulgular erken çocukluk döneminde başlar
- C) Üroporfirinojen dekarboksilaz enzimi eksiktir
- D) Ailesel ve edinsel tipi vardır
- E) Üroporfirin biriken asıl porfirin tipidir

**54.** Piyoderma gangrenozum hangisi ile birlikte gözlenmez?

*Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Crohn hastalığı
- B) Ülseratif kolit
- C) IgA gamopatisi
- D)** Skleroderma
- E) Sistemik lupus eritematozus

55. Rozasede fimatöz değişikliğinin **görülmediği** bölge hangisidir ?

*Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)*

- A)** Burun
- B) Kulak
- C) Alın
- D)** Yanak
- E) Çene

56. Herediter angioödemi olan bir hastada akut atak tedavisinde hangisi kullanılır?

*Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Taze donmuş plazma
- B) Kolşisin
- C) Epinefrin
- D)** Kortikosteroid
- E) Anabolik steroid

57. Hangisi postpartum kadınlarda abdominal veya perineal erizipelin en sık nedenidir?

*Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 4)*

- A)** Staphylococcus aureus
- B) Grup A streptokok
- C)** Grup B streptokok
- D) Grup C streptokok
- E) Grup G streptokok

58. Ultraviyole B ile ilgili **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

*Dermatolojik cerrahi ve foto(kemo)terapi (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** 290-320 nm dalga boyundadır
- B) Güneş yanığının en güçlü uyarıcısıdır

- C) Derin dermise kadar ulaşır
- D) Pencere camından geçemez
- E) Eritem etkisi UVA dan daha şiddetlidir

59. Deriye direk inokülasyonla yerleşen fungus hangisidir?

*Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Kromomikoz
- B) Blastomikoz
- C) Histoplazmoz
- D) Koksidiyodomikoz
- E) Parakoksidiyodomikoz

60. Bowen hastalığının etyolojisinde yer almayanı işaretleyiniz.

*Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Arsenik maruziyeti
- B) Güneş ışığı maruziyeti
- C) Merkel hücresi Poliyoma virusu
- D) Patched gen mutasyonu
- E) İnsan Papilloma virusu

61. Normal deri florası ile ilgili olarak yanlış ifadeyi işaretleyiniz.

*Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Staphylococcus aureus, insanların %20-35 inde burun ve perinede bulunur
- B) Deride en sık rastlanan koklar Staphylococcus epidermidis tir
- C) Aerobik korineform bakteriler Propionibacterium türleridir
- D) Gram negatif bakterilerden Acinetobacter türleri bulunur
- E) Sebase gland ve folliküllerde Propionibacterium türleri bulunur

62. Langerhans hücreleri ile ilgili olarak geçersiz ifadeyi işaretleyiniz.

*Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Kemik iliği kökenli, monosit-makrofaj sisteme ait hücrelerdir
- B) İmmün cevabın afferent yönünde işlev gösterirler
- C) Ultraviyole ışınlarına maruziyet sayıca artışlarına neden olur
- D) Keratinositler arasında stratum spinozum seviyesinde bulunurlar

- E) Antijen sunumunda rol oynayan dendritik yapıda hücrelerdir

63. Kadınlarda kutanöz metastaza en sık neden olan kanser hangisidir ?

*Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Over kanseri
- B) Endometriyum kanseri
- C) Meme kanseri
- D) Mide kanseri
- E) Kolon kanseri

64. Ultraviyole ışınlarıyla ilgili olarak hangisi doğrudur?

*Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Ozon tabakasındaki absorbsiyonu nedeniyle UVC'nin çoğu dünya yüzeyine erişmez
- B) 340-400 nm dalgaboyundaki ışık bandını UVC oluşturur
- C) UVA solar eritem ve güneş yanığının en önemli sorumlusudur
- D) UVA, UVB den 1000 kat daha eritematojeniktir
- E) İlaç ilişkili fotosensitivitenin en sık nedeni UVB'dir

65. Majocchi granüلومundan en sık izole edilen etken hangisidir?

*Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Epidermophyton floccosum
- B) Microsporium canis
- C) Trichophyton rubrum
- D) Trichophyton tonsurans
- E) Microsporium gypseum

66. Darier hastalığında **görülmeyeni** işaretleyiniz.

*Genodermatozlar ve konjenital anomalilikler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Lityum ile alevlenme
- B) İntertrijinöz tutulum
- C) Tırnaklarda kahverengi çizgiler
- D) El sırtlarında yassı papüller
- E) Yaz aylarında kötüleşme

67. Gebeliğin kolestatik kaşıntısı için doğru ifadeyi işaretleyiniz.

*Kaşıntı ve nörokutan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Gebeliğin ilk trimesterinde ortaya çıkar
- B)** Sonraki gebeliklerde tekrarlama olasılığı yüksektir
- C) Fetusta herhangi bir komplikasyona yol açmaz
- D) Doğumdan sonraki ilk hafta içinde kaşıntıda artış ortaya çıkar
- E) Tanı, alkalen fosfataz düzeylerinin yüksek saptanmasıyla konur

**68.** Hangisi edinsel keratodermi nedenlerinden değildir?

*Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Klimakterik
- B)** Akuajenik
- C)** Hipertiroidi
- D) Paraneoplastik
- E) İlaçlar

**69.** *P. humanus var. corporis*, deriden hiç kan emmeden giysilerde ne kadar süre canlı kalabilir ?

*Parazitik hastalıklar, ısırik ve sokmalar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) 3 gün
- B) 1 hafta
- C) 2 hafta
- D)** 1 ay
- E) 2 ay

**70.** Hangi fotodermatozda SLE gelişimi açısından hastaların takibi uygundur?

*Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Brachioradial pruritus
- B)** Polimorf ışık erüpsiyonu
- C) Berloque dermatiti
- D)** Solar ürtiker
- E) Kronik aktinik dermatit

**71.** Malign dönüşüm göstermesi beklenmeyen hastalığı işaretleyiniz.

*Müköz membran hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Oral submüköz fibrozis

- B)** Eritroplazi
- C)** Lökoplazi
- D)** Eroziv liken planus
- E) Pyostomatitis vejetans**

**72.** İdiyopatik guttat hipomelanoz ile ilgili olarak yanlış ifadeyi işaretleyiniz.

*Pigmentasyon bozuklukları (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Genellikle 40 yaşından sonra gelişir
- B)** Patogenezde ultraviyolenin rolü olduğu düşünülmektedir
- C) Kadınlarda ve sıkılıkla sırtta gözlenir**
- D) Lezyonlar depigmente efelide benzer**
- E) Histolojik olarak azalmış hipoaktif melanositler görülür**

**73.** Beş değerli antimon bileşiklerinin ciddi yan etkilerinden en sık görüleni hangisidir?

*Parazitik hastalıklar, ısırik ve sokmalar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Pankreatit**
- B) Hepatotoksisite**
- C) Kardiyotoksisite**
- D) Trombositopeni**
- E) Renal yetmezlik**

**74.** Peutz-Jeghers sendromu ile ilgili yanlış ifadeyi işaretleyiniz.

*Müköz membran hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Dudaklar ve bukkal mukozada multiple çullenme tarzında hiperpigmente maküller vardır**
- B) Tüm vücutta yaygın çullenme tarzı hiperpigmente maküller vardır**
- C) Gastrointestinal sistem hamartomatöz polipleri hastlığın tipik bulgularındandır**
- D) Hastalarda gastrointestinal sistem kanserlerinde artış vardır**
- E) Hastalarda meme ve genital bölge tümörlerinde artış vardır**

**75.** Likenoid dermatit hastalık grubundan olmayanı işaretleyiniz.

*Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Eritema diskromikum perstans**
- B) Greft-versus-host hastalığı**
- C) Keratozis likenoides kronika**

- D)** Liken simpleks kronikus
- E)** Paraneoplastik pemfigus

**76.** Hangisi subkorneal püstüler dermatozla en sık birliktelik gösteren tablodur?

*Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Crohn hastalığı
- B)** Aplastik anemi
- C)** IgA paraproteinemisi
- D)** Diabetes mellitus
- E)** Dermatomiyozit

**77.** Skabies ile ilgili olarak hangisi ya da hangileri doğrudur?

- I-Bebeklerde akral vezikülopüstüler uyuz için bir ipucudur
- II-Bebeklerde ve yaşlılarda yüz ve saçlı deri dahil tüm deri yüzeyi tutulabilir
- III-Kadınlarda meme başı ve vulvar bölge sıkılıkla tutulan bölgelerdir
- IV-Erkeklerde sakal bölgesi tutulumu tipiktir.

*Parazitik hastalıklar, isırık ve sokmalar (Zorluk derecesi: 2)*

- A)** I ve II
- B)** III ve IV
- C)** I ve III
- D)** I, II ve III
- E)** I, III ve IV

**78.** Hangisi dapsonla ilişkili bir yan etki değildir?

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Methemoglobinemi
- B)** Hemolitik anemi
- C)** Tromboz
- D)** Agranülositoz
- E)** Periferal nöropati

**79.** Telogen effluviuma neden olmayan durumu işaretleyiniz.

*Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 4)*

- A)** Hipertiroidi
- B)** A hipovitaminozu

- C) Antikoagulan kullanımı
- D) Sistemik lupus eritematozus
- E) Cerrahi girişimler

80. IL-2 üzerinden etki ederek epidermiste CD4 ve CD8 hücrelerinin azalmasına neden olan ilacı işaretleyiniz.

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Azatioprin
- B) Mikofenolat mofetil
- C) Siklosporin
- D) Dapson
- E) Hidroksüre

81. Hangisi alopesi areata ile birlikte görülebilen tırnak değişikliklerinden değildir?

*Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Pitting
- B) Lökonişi
- C) Lunulada eritem
- D) Dorsal pitergium
- E) Trakionişi

82. Pitriyazis rubra pilarisin tipik tırnak bulgusunu seçiniz.

*Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Yüksek tırnak
- B) Onikoliz
- C) Kahve-sarı renk değişikliği
- D) Lökonişi
- E) Beau çizgileri

83. Hangisi eritema nodozum histopatolojisi için tanımlayıcı tipik özelliklerden biridir?

*Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Lobüler/mikst olabilen pannikülit
- B) Lökositoklastik vaskülit
- C) Miescher in mikrogranülomları

- D) Lipsoiderde iğne şekilli yarıklar
- E) Subkutiste membranokistik değişiklikler

84. Eritrodermisi olan bir çocuk hastada beraberinde atopik dermatit benzeri lezyonlar, trikoreksis invajinata, immün yetmezlik varsa hangi tablo düşünülür?

*Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Wiskott Aldrich sendromu
- B) Hiperimmunglobulin E sendromu
- C) Nonbüllöz konjenital iktiyoziform eritroderma
- D) Netherton sendromu
- E) Cockayne sendromu

85. Hangi hastalıkta eritema nodozum birlikteliği iyi prognoz göstergesidir?

*Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Behçet hastalığı
- B) Lenfoma
- C) Histoplazmoz
- D) Sarkoidoz
- E) Tüberküloz

86. Hangisi ilaç etkileşimi nedeniyle metotreksat ile birlikte kullanılmaz?

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Penisilin
- B) Digoksin
- C) Hidroklorotiazid
- D) Atorvastatin
- E) Sitalopram

87. Hangisi liken planus histopatolojisinde beklenen bulgu değildir?

*Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Civatte cisimcikleri
- B) Hiperkeratoz
- C) Parakeratoz
- D) Hiperganüloz

- E) Likenoid lenfositik infiltrasyon

88. İnfantil akropüstüloz ayırıcı tanısında öncelikli düşünülmeli gereken klinik tablo hangisidir?

*Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Konjenital kandidiyazis
- B) Skabiyes
- C) Dishidrotik egzema
- D) İnfantil eozinofilik püstüler follikülit
- E) Eritema toksikum neonatorum

89. Yenidoğanda topikal ilaç kullanımında toksisite riskini artırmayan durumu işaretleyiniz.

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Vücut yüzeyi / vücut ağırlığı oranının fazla olması
- B) Hepatik metabolizmanın düşük olması
- C) Böbreğin süzme fonksiyonunun düşük olması
- D) Plazma proteinlerine bağlanma oranının yüksek olması
- E) Epidermal bariyer fonksiyonunun yetersiz olması

90. Melanositik nevus gelişiminde en az önemli olan faktör hangisidir?

*Melanositik nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Açık deri rengi
- B) Genetik faktörler
- C) Gebelik
- D) Ultraviyole
- E) Irklar arasında farklılık

91. Fox Fordyce hastalığının tedavisinde hangisi kullanılmaz?

*Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Topikal tretinoïn
- B) Fototerapi
- C) Oral kontraseptifler
- D) Kalsinörin inhibitörleri
- E) Topikal alüminyum tuzları

92. El içi ve ayak tabanında tipik punktat keratozlar hangi tabloda görülür?

*Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Radyasyon keratozu
- B) Katran keratozu
- C) Hidrokarbon keratozu
- D) Arsenik keratozu**
- E) Aktinik keratoz

**93.** Hangisi Parvovirus B19'un ilişkili olabileceği durumlardan biri değildir?

*Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Eritema infeksiyozum
- B) Küçük damar vaskülitı
- C) El-ayak-ağız hastalığı**
- D) Giannotti-Crosti sendromu
- E) Papüler purpurik eldiven çorap hastalığı

**94.** Hangisinde çok sayıda "Cafe Au Lait" lekesi bulunmaz?

*Genodermatozlar ve konjenital anomalilikler (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Mc-Cune Albright sendromu
- B) Fabry hastalığı**
- C) LEOPARD sendromu
- D) Piebaldizm
- E) Tuberokleroz

**95.** Kalsipotriol kullanımıyla ilgili olarak yanlış ifadeyi işaretleyiniz.

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Fototerapi öncesinde uygulanacak olursa etkisi azalır
- B) Renal hastalığı olanlarda hiperkalsemi riski bulunur
- C) 100 gr/hf üzeri uygulamada paratiroid hormon düzeyi bakılır
- D) Gebelik ve laktasyonda kullanımı kontrendikedir**
- E) Kortikosteroidlerle kombine kullanılması etkisini arttırmır

**96.** Izotretinoïn kullanımında yan etki olarak görüleni işaretleyiniz.

*Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Hipertrikoz**

- B)** Kilo artışı
- C)** Miyalji
- D)** Kreatinin yüksekliği
- E)** Hipopigmentasyon

**97.** Hangisi sistemik kontakt dermatitin nadir görülen formunu tanımlar?

*Dermatitler, ekzemalar, immunyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Rud sendromu
- B)** Baboon sendromu
- C)** Snear-Usher sendromu
- D)** İrritabl barsak sendromu
- E)** Gardner sendromu

**98.** "Karpuz mide" hangi bağ dokusu hastalığının bulgusudur?

*Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Dermatomiyozit
- B)** Skleroderma
- C)** Sistemik lupus eritematozus
- D)** Sjögren sendromu
- E)** Jeneralize morfea

**99.** Yüksek ateşin düşmesini izleyen diffüz ekzantemle karakterize çocukluk çağının viral hastalığını işaretleyiniz.

*Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Rozeola infantum
- B)** Kızamık
- C)** Kızamıkçık
- D)** Eritema infeksiyozum
- E)** Çiçek hastalığı

**100.** Tırnak değişikliğine neden olan konjenital ya da herediter hastalıklardan olmayanı işaretleyiniz.

*Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 4)*

- A)** Pakionişa konjenita tip 1
- B)** Pakionişa konjenita tip 2

- C) Psödoksantoma elastikum**
- D) Distrofik epidermolizis bülloza**
- E) Darier hastalığı**