

2015 Yeterlik Sınavı

1. Likenifikasyonun histopatolojisinde hangisi **bulunmaz**?

Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 3)

- A) Akantoz
- B) Hiperkeratoz
- C) Akantoliz
- D) Retelerde uzama
- E) Spongioz

2. Hangisi apokrin ter bezleri ile ilgili bir hastalıktır?

Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

- A) Granulozis rubra nasi
- B) Riley-Day sendromu
- C) Ross sendromu
- D) Frey dendromu
- E) Fox-Fordyce hastalığı

3. Rozaseanın klinik özellikleri arasında **yer almayan** hangisidir?

Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 1)

- A) Foliküler tıkaçlar
- B) Papül ve püstüller
- C) Kalıcı eritem
- D) Telenjiektazi
- E) Fimatöz değişiklikler

4. Topikal akne ilaçlarından hangisi **Malassezia furfur** tarafından üretilir?

Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Benzoil peroksit
- B) Azelaik asit
- C) İzotretinoin
- D) Nadifloksasin
- E) Tetrasiklin

5. Epidermodisplazia verrusiformis hastalarında en sık hangi HPV tipleri saptanır?

Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 4)

- A) 5 ve 8
- B) 3 ve 10
- C) 13 ve 32
- D) 16 ve 18
- E) 27 ve 57

6. Virus latent halde iken konak savunması tarafından neden tanınmaz?

Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Hastanın immün yanıtı yetersizdir
- B) Reaktivasyonda viruslar sinir periferine göç edemez
- C) Virus latent halde viral proteinleri üretmez
- D) Virusun latent halde lipid zarfı bulunmaz
- E) Viruse karşı antikorlar gelişmez

7. Papüler purpurik eldiven çorap sendromunun etkenini işaretleyiniz.

Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Paramiksovirus
- B) Riketsia

- C) HHV-8
- D) Parvovirus B 19**
- E) Variola virus

8. Yanaklarda asemptomatik bir eritemle (tokatlanmış yanak) başlayan çocukluk çağının viral hastalığını işaretleyiniz.

Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 1)

- A) Rozeola infantum
- B) Kızamık
- C) Kızamıkçık
- D) Eritema Enfeksiyozum**
- E) Kızıl

9. Topikal retinoidlerden hangisi kütanöz T hücreli lenfoma tedavisinde kullanılmaktadır ?

Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 2)

- A) Adapalen
- B) Tretinoin
- C) Tazaroten
- D) Beksaroten**
- E) İzotretinoin

10. Kaposi sarkomunun tedavisinde kullanılan topikal retinoidi işaretleyiniz.

Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 3)

- A) Tretinoin
- B) Alitretinoin**
- C) Adapalen
- D) Tazaroten

E) Beksaroten

11. Minoksidilin etki mekanizmalarından hangisi saç büyümesinin stimülasyonunda **rol oynamaz?**

Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 5)

- A) Telogen fazda prematür sonlanma yapar.
- B) Anagen fazı uzatır.
- C) Vasküler endotelyal büyüme faktörünü artırır.
- D) Vasküler düz kasta gevşemeye neden olur.
- E) Prostoglandin sentezini artırır.

12. Laktasyon döneminde anne tarafından kullanılabilen ilacı işaretleyiniz.

Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 3)

- A) Metotreksat
- B) Mikofenolat mofetil
- C) Azotioprin
- D) Hidroksiklorokin
- E) Siklosporin

13. Yüksek doz ve uzun süreli kullanımı steriliteye yol açabilen ilacı işaretleyiniz.

Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 3)

- A) Antimalaryaller
- B) Siklofosamid
- C) Asitretin
- D) Takrolimus
- E) Azatioprin

14. Periferel nöropatiye neden olan ilacı işaretleyiniz.

Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 2)

- A) Dapson
- B) Hidroksiklorokin
- C) Metotreksat
- D) Mikofenolat mofetil
- E) Azathioprin

15. Baldırında 2 cm çaplı ortası ülsere viyolese eritemli nodüler lezyon bulunan, ve özgeçmişinde 1 yıl önce akciğer tüberkülozu tanısı ile tedavi gördüğü öğrenilen orta yaşlı bayan olgu için tanı nedir?

Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

- A) Sitofajik histiyositik pannikulit
- B) Eritema nodozum
- C) Alfa-1 antitripsin panniküliti
- D) Soğuk pannikuliti
- E) Eritema induratum

16. Eritema nodozumda en sık rastlanan etyolojik neden nedir?

Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk derecesi: 1)

- A) Üst solunum yolu infeksiyonu
- B) Tüberküloz
- C) Sarkoidoz
- D) İnflamatuar barsak hastalıkları
- E) İlaçlar

17. Saçlarda kırılma/ kopmaya neden olmayan hastalık hangisidir?

Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

- A) Pili torti

- B) Trikoreksis invaginata
- C) Gevşek anagen sendromu
- D) Trikoreksis nodosa
- E) Trikoşizis

18. Alopesi areatada başlıca hangi hücrelerin infiltrasyonu görülür?

Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

- A) B-lenfositler
- B) T-lenfositler
- C) Makrofajlar
- D) Dendritik hücreler
- E) Nötrofiller

19. Sistemik isotretinoin kullanımına bağlı görülen yapısal saç anomalisini işaretleyiniz.

Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 5)

- A) Pili torti
- B) Moniletrijs
- C) Pili annulati
- D) Pili multigemini
- E) Pili bifurkati

20. Tüberosklerozda görülen tırnak tümörü hangisidir?

Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Subungual eksoztozis
- B) Miksoid kist
- C) Fibrom

- D) Glomus tümörü
- E) Onikomatrikoma

21. Hangi bulgu psoriasisin tırnak yatağı tutulumunu tanımlar?

Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 2)

- A) Yüksük tırnak
- B) Subungual hiperkeratoz
- C) Beau çizgileri
- D) Lökoniş
- E) Onikoreksis

22. Mukoza tutulumu görülen psoriasis formu hangisidir?

Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 2)

- A) Guttat psoriasis
- B) İnvers psoriasis
- C) Püstüler psoriasis
- D) Psoriatik eritroderma
- E) Psoriasis vulgaris

23. Vitiligonun topikal tedavinde **kullanılmayan** ilacı işaretleyiniz.

Pigmentasyon bozuklukları (Zorluk derecesi: 2)

- A) Kortikosteroidler
- B) Kalsinörin inhibitörleri
- C) Kalsipotriol
- D) Antralin
- E) Psödokatalaz

24. Hangi hastalık özellikle fleksural alanlarda retiküler hiperpigmentasyonla birlikte komedon benzeri papül ve skar oluşumu ile karakterizedir?

Pigmentasyon bozuklukları (Zorluk derecesi: 4)

- A) Gall-Galli hastalığı
- B) Diskeratozis konjenita
- C) X e bağlı retiküler pigmentasyon
- D) Dowling-Degos hastalığı
- E) Dermatopati pigmentoza retikularis

25. *Phthirus pubis*'in yol açtığı kirpik bitlenmesi tedavisinde kullanılan vazelin günde kaç kez ve ne kadar süre uygulanmalıdır ?

Parazitik hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk derecesi: 4)

- A) Günde 1 kez, 1 gün
- B) Günde 2 kez, 1 gün
- C) Günde 1 kez, 2 gün
- D) Günde 1 kez, 5 gün
- E) Günde 2 kez, 8 gün

26. Kentsel tip kütanöz leishmaniosis'de etken nedir?

Parazitik hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk derecesi: 2)

- A) *Leishmania major*
- B) *Leishmania mexicana*
- C) *Leishmania infantum*
- D) *Leishmania tropica*
- E) *Leishmania aethiopica*

27. Hangisi lokalize kütanöz layşmanyaziste sistemik tedavi endikasyonları arasında **yer almaz?**

Parazitik hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Hastanın immünsüprese olması
- B) Mukokütanöz hastalığın eşlik etmesi
- C) Kolda 2 cm çaplı nodüler lezyon olması
- D) Rezidivan formun gelişmesi
- E) Sporotrikoid formun gelişmesi

28. Aşağıdakilerden hangisi ağızda derin ülser neden olur?

Müköz membran hastalıkları (Zorluk derecesi: 1)

- A) Herpanjina
- B) El ayak ağız hastalığı
- C) Su çiçeği
- D) Sifiliz gomu
- E) Herpes simpleks

29. Oral lezyonlar içerisinde malignite potansiyeli en yüksek olan tablo hangisidir?

Müköz membran hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Liken planus
- B) Darier hastalığı
- C) Lökoedema
- D) Lökoplaki
- E) Eritroplaki

30. Bir meslek hastalığı olarak karşımıza çıkabilen mikobakteriyel hastalığı işaretleyiniz.

Mikobakteriyel hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Lupus vulgaris
- B) Skrofuloderma

C) Tuberkulozis verrukoza kutis

D) Papulonekrotik tuberkülid

E) Liken skrofulosorum

31. Sarkoidoz varyantlarından Darier -Roussy hastalığında hangi tip deri lezyonu görülür?

Makrofaj ve monosit hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

A) Subkutan nodül

B) Violase plak

C) Papül

D) Annüler plak

E) Makülopapül

32. Ağrısız servikal lenfadenopati hangi histiositoz tipinin özelliğidir?

Makrofaj ve monosit hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

A) Rosai Dorfman hastalığı

B) Multisentrik retikülohistiositoz

C) Ksantoma disseminatum

D) Indetermine hücreli histiositoz

E) Hand-Schuller-Christian hastalığı

33. Lazer epilasyonda en başarılı sonuç hangi hasta grubunda alınır?

Lazer cerrahisi ve kozmetik dermatoloji (Zorluk derecesi: 2)

A) Açık renk ten-- koyu renk kıl yapısı

B) Açık renk ten--açık renk kıl yapısı

C) Koyu renk ten--açık renk kıl yapısı

D) Koyu renk ten--koyu renk kıl yapısı

E) Açık renk ten-- Gri saç

34. Periferik tıkaçıcı arter hastalığında en sık görülen yakınma hangisidir?

Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Egzersizle kalça ve bacaklarda ortaya çıkan ve istirahat ile düzelmeyen ağrı
- B) Egzersizle kalça ve bacaklarda ortaya çıkan ve istirahat ile düzelen ağrı
- C) İstirahat halinde ortaya çıkan ve egzersizle düzelen ağrı
- D) İstirahat halinde ortaya çıkan ve egzersizle düzelmeyen ağrı
- E) Egzersiz ve istirahatten bağımsız olan bacak ve kalça ağrısı

35. Primer Raynaud fenomeni tanı kriterleri arasında **yer almayan** işaretleyiniz.

Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Ekstremitelerde epizodik olarak gelişen siyanoz
- B) Simetrik veya bilateral tutulum
- C) Periferik arteriyel oklüzyon bulgularının olması
- D) İmmunolojik anomalilerin olmaması
- E) Normal tırnak yatağı kapillerleri

36. Kawasaki hastalığında en sık tutulan arter hangisidir?

Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Koroner arterler
- B) Derinin yüzeysel arterleri
- C) Temporal arterler
- D) Hepatik arterler
- E) Renal arterler

37. Hangisi Behçet hastalığı sistemik tutulumları arasında **yer almamaktadır?**

Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Artrit
- B) Miyokardit
- C) Glomerulonefrit
- D) Üveit
- E) Osteomyelit

38. Mikozis fungoides klinik görünülerinden hangisi sıklıkla çocuk ve gençlerde gözlenir?

Kutanöz lenfoid hiperplazi, lenfomalar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Pigmente purpura benzeri
- B) Hipopigmente
- C) Folikülotropik
- D) Granümatöz gevşek deri
- E) Poikiloderma vaskülare atrofikans

39. Primer kutanöz B hücreli lenfomaların tedavisinde hangisi **yer almaz?**

Kutanöz lenfoid hiperplazi, lenfomalar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Lokal radyoterapi
- B) Cerrahi eksizyon
- C) İnterferon- α -2a
- D) CHOP + Rituksimab
- E) Beksaroten

40. Oral pemfigus vulgarisin duyarlılığı en yüksek tanı aracı hangisidir?

Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)

- A) Dsg3-ELİSA

- B) İndirek immünofloresan
- C) Histopatoloji
- D) Tzanck testi
- E) Nikolsky belirtisi

41. Grover Hastalığına histopatolojik olarak **benzemeyen** hastalığı işaretleyiniz.

Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Darier Hastalığı
- B) Pemfigus vulgaris
- C) Pemfigus Foliaceus
- D) Dermatitis Herpetiformis
- E) Hailey-Hailey Hastalığı

42. Hangisi dermatitis herpetiformis kesin tanısı için gereklidir?

Kronik büllü hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Papiller dermiste nötrofilik infiltrasyon
- B) İnce barsak biopsisinde gluten-sensitif enteropati saptanması
- C) Papiller dermiste granüler IgA depolanması
- D) Semptomların dapsonla düzelmesi
- E) HLA-DQ genotipinin gösterilmesi

43. Skleroderma patogeneğinde yer alan **en erken** bulgu hangisidir?

Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Endotel hasarı-vasküler disfonksiyon
- B) Th2 tipi sitokin üretimi
- C) B hücresi aktivasyonu

- D) Fibroblast proliferasyonu
- E) Glukozaminoglikan sentezi

44. Hangisi miks bağ dokusu hastalığında en sık görülen dermatolojik bulgulardandır?

Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

- A) Eritema nodozum
- B) Kapillerit
- C) Alopesi
- D) Raynaud fenomeni
- E) Eritema multiforme

45. Dermatomyozitin deri bulguları arasından tanısal değeri en önemli olanı işaretleyiniz.

Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

- A) Poikiloderma
- B) Kutikular distrofi
- C) Periorbital ödem
- D) Kalsinozis kutis
- E) Jinjival telenjiektazi

46. Notaljia parestetika ile ilgili doğru ifadeyi işaretleyiniz.

Kaşıntı ve nörokutan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)

- A) En sık lomber dermatomlarda izlenir
- B) Genellikle bilateraldir
- C) Sinire bası yapan hareketlerle tetiklenebilir
- D) Dokunmakla hassas papüllerle karakterizedir
- E) Tedavide topikal beksaroten kullanılır

47. Psikojenik kaşıntının tipik özelliğini işaretleyiniz.

Kaşıntı ve nörokutan dermatozlar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Günlük aktiviteler sırasında artar
- B) Geceleri vücut ısısının artmasıyla şiddetlenir
- C) Lezyonlar elle ulaşılabilen yerlere sınırlıdır
- D) Lezyonlar unilaterale dağılım gösterir
- E) En sık yüz bölgesinde tutulum izlenir

48. Aşağıdakilerden hangisi ilaçla ilişkili Sweet Sendromu tanı kriterlerinden **değildir**?

İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 3)

- A) İlaç kesilmesinden sonra lezyonun gerilemesi
- B) Ateş > 38 °C
- C) Lökositoz
- D) Histopatolojik olarak vaskülit bulunmaksızın dermal nötrofilik infiltratın bulunması
- E) Ağrılı eritemli plak ve nodüller

49. Aşağıdaki ilaç döküntülerinin hangisinde ilaç alımından aylar sonra döküntü başlayabilir?

İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Psoriasiform ilaç reaksiyonu
- B) Pitriyazis rozea benzeri ilaç reaksiyonu
- C) Eritema nodozum benzeri ilaç reaksiyonu
- D) Seboreik dermatit benzeri ilaç reaksiyonu
- E) Likenoid ilaç reaksiyonu

50. Erizipeloid için temel bulaşma yolu hangisidir?

Diğerleri (Zorluk derecesi: 3)

- A) Toprakla temas
- B) Doğrudan kişiden kişiye temas
- C) Kediyle temas, ısırma veya tırmalama
- D) Çiğ balık ve et ile temas
- E) İnhalasyon yoluyla

51. Erizipel için doğru ifadeyi işaretleyiniz.

Diğerleri (Zorluk derecesi: 3)

- A) Ortalama 15 günlük bir inkübasyon süresi vardır.
- B) Yeni doğanlarda en önemli etken grup C streptokoklardır.
- C) Perifere doğru ilerleyen lezyonun kenarları belirsizleşir.
- D) Şiddetli tutulumda vezikül ve büller gözlenir.
- E) Histopatolojide trombüs oluşumu ve lökositoklazi izlenir.

52. Toksik epidermal nekrolizde kullanılan hangi tedavi Fas ligand'ın Fas'a bağlanmasını engelleyerek etki gösterir?

İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Kortikosteroidler
- B) IVIg
- C) Siklosporin
- D) Talidomid
- E) Siklofosfamid

53. Deride ayrışma alanlarının yüzdelerinden hangisi Stevens-Johnson Sendromu - Toksik Epidermal Nekroliz overlap tanısı için uygundur?

İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 1)

- A) 5

- B) 15
- C) 35
- D) 45
- E) 70

54. Filagrin ekspresyon bozukluğu olan iktiyoz formunu işaretleyiniz.

Genodermatozlar ve konjenital anormallikler (Zorluk derecesi: 2)

- A) Epidermolitik hiperkeratoz
- B) X e bağı iktiyozis
- C) İktiyozis vulgaris
- D) Lameller iktiyozis
- E) Konjenital iktiyoziform eritroderma

55. Yüz ve göğüs ön yüzünde kirli sarı-kırmızı sert papüller, el ve ayak tabanlarında punktat keratoz ve tırnaklarda "V" şeklinde çentiklenme olan 20 yaşında erkek olguda tanı nedir?

Genodermatozlar ve konjenital anormallikler (Zorluk derecesi: 3)

- A) Darier Hastalığı
- B) Hailey-Hailey Hastalığı
- C) Diskeratozis konjenita
- D) Werner Sendromu
- E) Degos hastalığı

56. Dermatofitler ile ilgili **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

Fungus ve mayalara bağı hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Dermatofitler keratinize dokuya invaze olabilmek için keratinaz üretirler
- B) Sebumun dermatofitler üzerine inhibe edici özelliği vardır
- C) Antropofilik dermatofitler insandan insana bulaş gösterirler

- D) Trichophyton schoenleinii wood ışığı muayenesinde sarı refle verir
- E) Konaktaki proteaz inhibitörleri dermatofitlerin invazyonunu sınırlarlar

57. Yetişkinlerde ayak tırnaklarında tinea unguium tedavi protokollerinden hangisi doğrudur?

Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Terbinafin 250 mg/gün, 6 hafta
- B) Terbinafin 250 mg/gün, 9 hafta
- C) Itrakonazol 200 mg/gün, 12 hafta
- D) Itrakonazol 200 mg/gün, 6 hafta
- E) Flukonazol 200 mg/hafta, 3 ay

58. Kromblastomikoza ait klinik özelliği işaretleyiniz.

Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Merkezi skarla iyileşen annüler, verrüköz, granülatöz plağa ilerleyen lezyon
- B) Lokal yerleşimli drene olan nodüller, sinüsler ve yumuşak doku şişliği
- C) Lenfatik drenaj boyunca multipl dermal ve subkutan nodül ve ülserler
- D) Aft benzeri ülserler, sinüsler ve köprüleşmeler
- E) Sert papüller, hemorajik büller, nekrotik ülserler

59. Hangisi eritema ab igne gelişiminde rol oynayan risk faktörü **değildir**?

Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Elektrikli battaniye kullanımı
- B) Diz-üstü bilgisayar kullanımı
- C) İnfrared lambası kullanımı
- D) Sıcak-su torbası kullanımı
- E) Jakuzi kullanımı

60. İkinci derece yüzeysel termal yanık için en uygun ifadeyi işaretleyiniz.

Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Yüzeysel dokularda transüstasyona bağlı ödem, bazen vezikülasyon, iyileşme hızlı, skarsız
- B) Tüm katlarıyla deri, subkutan doku ve alttaki tendonlarda etkilenme, iyileşme greft gerektirir
- C) Tüm katlarıyla deri ve subkutan doku hasarı, ülser oluşumu, iyileşme greft gerektirir
- D) Epidermal deskuamasyonla sonlanan eritem, ağrı ve lokal ısı artışı, iyileşme hızlı, skarsız
- E) Retiküler dermise kadar etkilenme, renk soluk, ağrısız, skarla iyileşir

61. Sweet sendromunda ilk seçenek tedavi ajanını işaretleyiniz.

Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 2)

- A) Kolşisin
- B) Dapson
- C) Sistemik kortikosteroid
- D) GMC-SF
- E) İmmüsupresifler

62. Pyoderma gangrenosum varyantlarından hangisinde hematolojik malignite eşlik etme riski yüksektir?

Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 4)

- A) Pyostomatitis vegetans
- B) Peristomal pyoderma gangrenosum
- C) Süperfisyel granülomatöz pyoderma
- D) Büllöz pyoderma gangrenosum
- E) PAPA sendromu

63. Hangisi "Nötrofilik ürtiker" in bir özelliğidir?

Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 4)

- A) Vasküler fibrin birikimi ve karyoreksis
- B) 24 saatten uzun süren ürtika plakları**
- C) IgG yapısında otoantikörlerin varlığı
- D) β 2 adrenerjik reseptör gen polimorfizmi
- E) Ailesel akdeniz ateşi ile birliktelik

64. Angioödem **görülmeyen** fiziksel ürtiker tipini işaretleyiniz

Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 2)

- A) Dermografizm**
- B) Soğuk ürtikeri
- C) Sıcak ürtikeri
- D) Kolinergik ürtiker
- E) Basınç ürtikeri

65. Liken planus tedavisinde **kullanılmayan** ajanı işaretleyiniz.

Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) PUVA
- B) Altın**
- C) Metotreksat
- D) Antimalaryaller
- E) Siklosporin

66. Marjolin ülser tanımı için doğru ifadeyi işaretleyiniz.

Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 2)

- A) Venöz yetmezlikli olgularda gözlenen kronik bacak ülseri**
- B) Lepralı olgularda gözlenen ülsere lezyon

- C) Skar dokusu üzerinde gelişen skuamöz hücreli kanser
- D) Bazal hücreli kanserde gözlenen ülser
- E) Kaposi sarkomunun AIDS li olgularda görülen formu

67. Bowen hastalığı için **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)

- A) En sık baş ve boyun bölgesinde yerleşim gösterir
- B) Kriyoterapi öncelikli tedavi yöntemidir
- C) Aktinik keratoz zemininde gelişebilir
- D) Human papilloma virus etyolojik faktörlerdendir
- E) Displastik hücreler adneks epitellerine yayılabilir

68. Papillon-Lefèvre Sendromu tedavisinde hangisi **kullanılmaz**?

Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Asitretin
- B) Eretinat
- C) Metotreksat
- D) Topikal keratolitikler
- E) Siklosporin

69. Hangisi Pitiriyazis rosea etyopatogenezinde yer alır?

Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Human herpes virüs 6 (HHV-6)
- B) İnsan immun yetmezlik virüsü (HIV)
- C) Epstein Barr virüsü (EBV)
- D) Hepatit B virüsü (HBV)

E) Hepatit C virüsü (HCV)

70. Dama tahtası paternde parakeratoz ve akantolitik diskeratoz hangi hastalığın tipik patolojik bulgusudur?

Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Pitriyazis likenoides kronika
- B) Pitriyazis likenoides et varioliformis akuta
- C) Psoriasis vulgaris
- D) Pitriyazis rubra pilaris
- E) Keratosis likenoides kronika

71. Hangisi fakomatozis pigmentokeratotikanın bulgularındandır?

Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 4)

- A) Sebace nevus, serebral anomaliler
- B) Epidermal nevus, katarakt
- C) Organoid sebace nevus, benekli lentiginöz nevus
- D) Epidermal nevus, Becker nevus
- E) Epidermal nevus, vasküler malformasyonlar

72. Yüzeysel Bazal hücreli karsinoma en sık nereyi tutar?

Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 2)

- A) Gövde ve ekstremiteler
- B) Saçlı deri
- C) Yüz bölgesi
- D) El ve ayaklar
- E) Tırnaklar ve çevresi

73. Kutanöz olmayan formlardan biri olarak sınıflandırılabilen porfiriyayı işaretleyiniz.

Endokrin, nutrisyonel ve metabolizma hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

- A) Variegat porfirya
- B) Herediter koproporfirya
- C) Konjenital eritropoietik porfirya
- D) Akut intermitant porfirya**
- E) Eritropoietik protoporfirya

74. Nekrobiozis lipoidikadaki histopatolojik bulguyu işaretleyiniz.

Endokrin, nutrisyonel ve metabolizma hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)

- A) Lobuler pannikülit
- B) Epidermal hipertrofi
- C) Bazal membranda IgM, C3 depolanması
- D) Palizatlanan granüloamatöz dermatit**
- E) Diffüz müsin depolanması

75. Hangisi kollodyon bebeğin ayırıcı tanısına **girmez**?

Diğerleri (Zorluk derecesi: 3)

- A) Lameller iktiyoz
- B) Sjögren-Larssen sendromu
- C) Trikotiodistrofi
- D) İnfantil Gaucher hastalığı
- E) İnfantil seboreik dermatit**

76. Sklerödem ile birlikte en sık hangi tip paraproteinemi görülür?

Diğerleri (Zorluk derecesi: 4)

- A) IgA

- B) IgD
- C) IgE
- D) IgG
- E) IgM

77. Edinsel perforan dermatoz (Kyrle Hastalığı) en sık hangi tablo ile ilişkilidir?

Diğerleri (Zorluk derecesi: 3)

- A) Kalp yetmezliği
- B) Siroz
- C) Tüberküloz
- D) Böbrek yetmezliği
- E) Sarkoidoz

78. Hangi tanımlama epidermoid kist için doğrudur?

Diğerleri (Zorluk derecesi: 3)

- A) En sık gözlenen kutanöz kistdir
- B) En sık saçlı deride yerleşir
- C) İnfanların %75'inde özellikle yüz yerleşiminde sıktır
- D) Kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alır
- E) Lamine keratin ve çok sayıda vellüs kıl içerir

79. Yara iyileşmesi ve yara bakımı açısından **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

Dermatolojik cerrahi ve foto(kemo)terapi (Zorluk derecesi: 3)

- A) Temiz yaralar, steril olup, sınıf 1 de yer almaktadır.
- B) Temiz kontamine yaralarda enfeksiyon oranı %10 dur.
- C) Temiz kontamine yaralarda antibiyotik profilaksisi yapılmalıdır.

- D) Kontamine yaralar, nonpürülan akıntılı ve akıntısız yaralardır.
- E) Kontamine yaralarda enfeksiyon oranı % 20-30 dur.

80. Darbant ultraviyole B fototerapisi ile ilgili **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

Dermatolojik cerrahi ve foto(kemo)terapi (Zorluk derecesi: 2)

- A) En yüksek 311 nm en düşük 305 nm ışık salınımı yapan TL-01 lambaları kullanılır
- B) Tedavi dozları minimal fototoksik doza (MPD) göre belirlenir
- C) Maksimum etki için hafif bir eritem gereklidir
- D) Uygulama öncesi nemlendirici kullanımı tedavi etkinliğini artırır
- E) Katran, antralin, topikal steroidler ve kalsipotriol ile kombine kullanılabilir

81. SALT (Skin Associated Lymphoid Tissue), DMU (Dermal Microvascular Unit), DIS (Dermal Immune System), ve SIS (Skin Immune System)'in tümünde ortak bulunan hücre hangisidir?

Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 3)

- A) Langerhans hücreleri
- B) Dermal T hücreleri
- C) Doku dentritik hücreleri
- D) Vasküler endotel hücreleri
- E) Mast hücreleri

82. Komedon **görülme**yen hastalığı işaretleyiniz.

Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 4)

- A) Akne vulgaris
- B) Favre-Racouchot sendromu
- C) Hidrokistoma
- D) Trikofoliküloma
- E) Trikostazis spinüloza

83. Hangisi ağırlı bir nodül örneğidir?

Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 3)

- A) Trikofoliküloma
- B) Trikoepitelyoma
- C) Kalsinosis kutis
- D) Ekrin spiradenom**
- E) Kondroid siringom

84. Aşağıdaki cümleyi doğru olarak tamamlayan ifadeyi işaretleyiniz. Fordyce lekesi, sebace bezlerin ...

Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 3)

- A) göz kapağı tarsal yüzeyine yerleşmiş şeklidir
- B) yanak mukozası ve dudaklara yerleşmiş şeklidir**
- C) prepisium ve penis frenulumuna yerleşmesidir
- D) meme başı bölgesine yerleşmesidir
- E) labia minörlere ektopik yerleşimidir

85. Yaygın ve tedaviye dirençli seboreik dermatit hangisinin önemli bir deri bulgusudur?

Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 5)

- A) Parkinson hastalığı**
- B) HBV enfeksiyonu
- C) Tip I diabetes mellitus
- D) Tip II diabetes mellitus
- E) Hipotiroidi

86. Dishidrotik ekzemada lezyonlar nerede gözlenir?

Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 1)

- A) El, ayak ve parmak dorsallerinde
- B) El, ayak ve parmak laterallerinde
- C) Kol ve bacak ekstensör yüzlerde
- D) Kol ve bacak fleksör yüzlerde
- E) Skalp ve yüzde

87. Aşağıdaki sistemik tedavi ajanlarının hangisinin kullanımı sonrasında generalize numuler dermatit gelişimi bildirilmiştir?

Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 3)

- A) Ribavirin
- B) Asitretin
- C) Metotreksat
- D) İntravenöz immünglobulin
- E) Takrolimus

88. Topikal olarak duyarlanılan allerjen ile sistemik karşılaşma sonucu orijinal duyarlanma bölgesinde dermatit ve ilave olarak yaygın dermatit, bazen eritrodermi görülmesine ne ad verilir ?

Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 2)

- A) Sistemik allerjik kontakt dermatit
- B) Kontakt ürtiker
- C) İrritan dermatit
- D) Fotokontakt dermatit
- E) Atopik dermatit

89. Atopik dermatite eşlik edebilen durumu işaretleyiniz.

Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 2)

- A) İktiyozis vulgaris

- B) Milia
- C) Trikotiyodistrofi
- D) Trakionişi
- E) Pitriazis versikolor

90. Yüksek α -protriptaz düzeyleri hangisinde saptanır?

Dermal ve subkutan tümörler (Zorluk derecesi: 3)

- A) Nodüler mastositoz
- B) Telenjiyektazy makülaris erüptiva perstans
- C) Mast hücreli lösemi
- D) Ürtikerya pigmentosa
- E) Difüz kutanöz mastositoz

91. Keloid ile ilgili doğru ifade hangisidir?

Dermal ve subkutan tümörler (Zorluk derecesi: 2)

- A) En sık yerleşim yeri yüzdür.
- B) Lezyon ağrılı veya kaşıntılı olabilir.
- C) Lezyon, orijinal yaralanma bölgesi sınırlarını aşmaz.
- D) Aylar/yıllar içinde kendiliğinden geriler.
- E) Tedavide ilk seçenek cerrahi eksizyondur.

92. Hangisi yumuşak şankır için doğrudur?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)

- A) İnkübasyon periyodu 1-30 gündür.
- B) Ağrısız, dekole ülserler karakteristiktir.
- C) Ülser zemininde granülasyon dokusu gelişimi iyidir.

- D) Gelişen adenit sıklıkla bilateralidir.
- E) Erken tedavi verilse bile bubo süpürasyonu olabilir

93. Sifilizli, HIV pozitif kişilerde BOS tetkikleri normale hangi tedavi şeması uygulanır?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)

- A) Benzatin penisilin G, i.m., 2.4 MÜ tek doz
- B) Benzatin penisilin G, i.m., 2.4 MÜ bir hafta ara ile 3 kez
- C) Benzatin penisilin G, i.m., 2.4 MÜ bir hafta ara ile 6 kez
- D) Kristalize penisilin G, i.v., 3-4 MÜ 4 saatte bir 10-14 gün
- E) Prokain penisilin G, i.m., 2.4 MÜ günde bir kez 10-14 gün

94. Lyme hastalığının ilk deri bulgusunu işaretleyiniz.

Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Eritema marginatum
- B) Eritema anülare sentrifigum
- C) Eritema migrans
- D) Eritema giratum repens
- E) Eritema multiforme

95. Perianal selülit için **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

Diğerleri (Zorluk derecesi: 2)

- A) Streptococcus pyogenes ile gelişir
- B) Dört yaş altında daha olağandır
- C) Sistemik semptomlar her zaman eşlik eder.
- D) Ağrılı defekasyon, kanlı gaita yakınmaları olabilir.
- E) Deriden alınan kültür tanı ve tedavi için yararlıdır.

96. Ektimanın klinik özellikleriyle ilgili olarak hangisi **yanlıştır**?

Diğerleri (Zorluk derecesi: 2)

- A) Lezyonlar en sık alt ekstremitelerde.
- B) Çocuk ve genç yaşta olmak risk faktörüdür.
- C) Sistemik semptomlar ve bakteriyemi sıktır.
- D) Lezyonlar yavaş ve skarla iyileşir.
- E) Vaskülitlerle ayırıcı tanıya girer.

97. Hangisi akral melanositik lezyon için malign dermoskopik paternlerdendir?

Melanositik nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)

- A) Paralel oluk paterni
- B) Kafes benzeri patern
- C) Paralel sırt paterni
- D) Fibriler patern
- E) Psödopigment ağı

98. Melanom metastazı için en önemli risk faktörü hangisidir?

Melanositik nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)

- A) Ülserasyon
- B) İnvazyon derinliği
- C) Vertikal büyüme fazında olması
- D) Nodüler melanom olması
- E) Ailede metastatik melanomlu birey olması

99. LEOPARD sendromunun bileşeni **olmayan** hangisidir?

Melanositik nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 5)

- A) Lentigo
- B) EKG deęişiklikleri
- C) Okuler hipertolarizm
- D) Pulmoner anevrizma
- E) Büyüme gerilięi

100. Merkezi kısmında sert konik bir uzantı ve çevresinde hiperkeratoz bulunan, mekanik nedenlerle ortaya çıkan ve bası ile ağrıya yol açan keratotik papüllerin spesifik adı nedir?

Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 2)

- A) Klavus
- B) Kallus
- C) Yaę fitięi
- D) Dekubitus ülserasyonu
- E) Liken simpleks kronikus