

## 2016 Yeterlik Sınavı

1. Deri şarbonu ile ilgili **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

*Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 1)*

- A) Ödem yapar
- B) Tanı serolojiyle konur**
- C) Hayvan teması vardır
- D) Şiddetli ağrı beklenmez
- E) Lezyon hemorajik olabilir

2. Hangisi nekrotizan fasiitin klinik özelliklerinden **değildir**?

*Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Hastalık çok hızlı ilerler
- B) Viyolese renkli, hemorajik bül görülür
- C) Hasta toksik görünümündedir
- D) Geniş spektrumlu sistemik antibiyotikler hızla düzelme sağlar**
- E) Şiddetli ağrılı lezyon daha sonra anestetik olur

3. Stafilokoksik haşlanmış deri sendromu için **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

*Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Erişkinlerde çoğu kez immünsupresyon ve renal yetmezlik varlığında gelişir
- B) Eksfoliyatif toksinler epidermiste desmoglein-1 i hedef alır
- C) Hastalıkta müköz membranlar tutulmaz
- D) Tanı, intakt büllerden yapılan kültürlerde stafilokokus aureusun üremesiyle konulur**
- E) Çocuklarda daha sık görülür

4. Toksik şok sendromunda **izlenmeyen** histolojik bulguyu işaretleyiniz?

*Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Spongiyoz
- B) Nekrotik keratinositler**
- C) Dermisde ödem
- D) Epidermisde nötrofiller
- E) Perivasküler lenfositik infiltrat

5. Ektima için **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

*Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Stafilokok veya streptokokların neden olduđu ülseratif pyodermidir.
- B) En sık bacaklar ve ayakların dorsal yüzlerinde yerleşir.
- C) Vezikül veya vezikülo-püstül şeklinde başlar.
- D) Lezyonlar birkaç haftada skar bırakmadan iyileşme eğilimindedir.
- E) Bölgesel adenopati gelişebilir.

6. Erizipeloid ile ilgili **yanlış** bilgiyi işaretleyiniz.

*Bakteriyel infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Etkeni Erysipelothrix rhusiopathia' dır
- B) Etken gram pozitif, mikroaerofilik, hareketsiz bir basildir
- C) Çiğ balık ve et ile temas risk faktörleridir
- D) En sık eller ve el parmaklarında yerleşir
- E) Tedavisinde vankomisin kullanılır

7. Sifiliz stigmatlarından Hutchinson triadı hangilerini kapsar?

*Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (Zorluk derecesi: 1)*

- A) İnterstisyel keratit, nöral tipte işitme kaybı, Hutchinson dişleri
- B) Enamel defektine bağlı diş çürükleri, kılıç kını tibia, semer burun
- C) Oral ragatlar, dut şeklinde molar dişler, işitme kaybı
- D) Palmopantar büller, kronik burun akıntısı, tiz ses
- E) Yüksek damak, skafoïd skapula, dizlerde ağrısız efüzyon

8. Yumuşak şankır için doğru ifadeyi işaretleyiniz.

*Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Ağrısız, subkutan nodüller şeklinde başlar
- B) HIV'li bireylerde klink tablo belirgin değildir
- C) HIV'li bireylerde ekstrasjenital tutulum sıktır
- D) Hematojen ve lenfatik yolla iç organlara yayılabilir
- E) Gebelik ve laktasyondaki hastaya tedavide, siprofloksasin verilebilir.

9. Benign fibrohistiyositik tümörler arasında **olmayan**ı işaretleyiniz.

*Dermal ve subkutan tümörler (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Keloid

- B) Hipetrofik skar
- C) Yumuşak fibrom
- D) Dermatofibroma
- E) Clear cell akantoma

10. Kaposi sarkomu'nun sistemik kemoterapi endikasyonları arasında yer almayan durumu işaretleyiniz.

*Dermal ve subkutan tümörler (Zorluk derecesi: 5)*

- A) Pulmoner tutulum
- B) Sistemik viseral tutulum
- C) Vücut yüzey alanının %5'inden daha fazla tutulum
- D) Her ay 10 ve üzerinde yeni kutanöz lezyon çıkışı
- E) Lenfödem

11. Atopik dermatitin major tanı kriteri olmayan seçeneği işaretleyiniz

*Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 1)*

- A) Kaşıntı
- B) İnfanlarda fasiyal ve ekstensör tutulum
- C) Erişkinlerde fleksural likenifiye dermatit
- D) Deri kuruluğu
- E) Ailevi atopi öyküsü

12. Dishidrotik ekzema gelişimine neden olmayan seçeneği işaretleyiniz?

*Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Emosyonel stres
- B) Sıcak hava/Güneş maruziyeti
- C) Nikel alerjisi
- D) IVIG tedavisi
- E) Ter bezi disfonksiyonu

13. Seboreik dermatit insidansı hangi hastalıkta artmaz?

*Dermatitler, ekzemalar, immünyetmezlik sendromları (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Parkinson
- B) AIDS

- C) Diabetes Mellitus
- D) İktiyozis
- E) Epilepsi

14. Sekonder deri lezyonunu işaretleyiniz.

*Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 1)*

- A) Yama
- B) Tümör
- C) Erozyon
- D) Vezikopüstül
- E) Plak

15. Eş zamanlı- senkron polimorfik erüpsiyonla seyreden hastalığı işaretleyiniz.

*Dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoimmunolojiye giriş (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Varisella
- B) Variola
- C) Psoriasis vulgaris
- D) Verruka vulgaris
- E) Vitiligo

16. Psoralenlerle ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

*Dermatolojik cerrahi ve foto(kemo)terapi (Zorluk derecesi: 5)*

- A) Trimetilspsoralen, banyo PUVA uygulamasında, 8-metoksipsoralenden daha fototoksiktir.
- B) Psoralenlerin serum konsantrasyonları bireyler arası farklılık göstermez.
- C) 5-metoksipsoralen, 8-metoksipsoralenden daha çok gastrointestinal intoleransa yol açar.
- D) Oral PUVA tedavisinde 8-metoksipsoralen dozu 1,2-1,8 mg/kg'dır.
- E) Topikal 8-metoksipsoralenin geniş yüzeylere uygulaması banyo uygulamasına göre daha düşük plazma düzeylerine yol açar.

17. Yara bakımı açısından preoperatif antisepsi ile ilgili olarak yanlış ifadeyi işaretleyiniz.

*Dermatolojik cerrahi ve foto(kemo)terapi (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Klorheksidin, Gram (+) ve Gram (-) organizmalara etkilidir.
- B) İyot içeren preparatlar, sıklıkla deride irritasyona yol açar.
- C) Hidrojen peroksit, steril deri hazırlığı için uygun bir preparat değildir.

- D) Hekzaklorofen çocuk ve hamilelerde kullanılmamalıdır.  
E) Alkol geniş yüzey alanlarının sterilizasyonunda önerilir.

18. Gebeliğin atopik erüpsiyonu için doğ ru olan hangisidir?

*Diğerleri (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Gebelikte en sık görülen pruritik dermatozudur.  
B) Olguların büyük çoğunluğunda 3.trimesterde ortaya çıkar  
C) Fetal mortalite riski artmıştır  
D) Stria distansa oluşumunu arttırır  
E) Serum IgE düzeyi yükselmez.

19. Muir-Torre sendromunda gözlenmeyen seçeneği işaretleyiniz.

*Diğerleri (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Sebace kanser  
B) Kolon kanseri  
C) Yumuşak fibrom  
D) Sebace adenom  
E) Keratoakantom

20. Akantozis nigrikans ile ilgili olarak yanlış ifadeyi işaretleyiniz.

*Endokrin, nutrisyonel ve metabolizma hastalıkları (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Malign tipi en fazla GIS adenokarsinomlarıyla birlikte dir  
B) Doğumda mevcut olan bir ailesel tipi vardır  
C) Endokrinopatilerle olan tipi en sıktır  
D) Histopatolojik olarak akantoz vardır  
E) Yalnızca avuç içleri tutulduğunda akciğer kanseri sıklıkla eşlik eder

21. Nevoid bazal hücreli karsinom (Gorlin sendromu) nun karakteristik bulgularından olmayan seçeneği işaretleyiniz?

*Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Çenede odontojenik kistler  
B) El ayaklarda çukurlaşmış çökükler  
C) Saçlı deri ve ciltte kalsiyum birikimleri, keratin kistler  
D) Kaburga, kafatası ve omurgalarda kemik anomalileri

**E)** Yünsü saç

**22.** Yüzeyel bazal hücreli karsinoma tedavisinde imikuimodun ideal tedavi şeması hangisidir?

*Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Haftada 5 gece
- B)** Hergün sabah -akşam iki kere
- C)** Haftada 3 gece
- D)** Haftada 3 gün sabah-akşam
- E)** Hergün akşamları bir kere

**23.** Hangi kanserin deriye metastaz yapması sonucunda "Karsinoma erizipeloides" tablosu ortaya çıkar?

*Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 2)*

- A)** Meme kanseri
- B)** Akciğer kanseri
- C)** Over kanseri
- D)** Kolon kanseri
- E)** Mide kanseri

**24.** Aktinik keratozun dermoskopik bulgusu olan seçeneği işaretleyiniz.

*Epidermal nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 4)*

- A)** Yaprak benzeri alanlar
- B)** Kaldırım taşı paterni
- C)** Komedon benzeri açıklıklar
- D)** Çilek paterni
- E)** Patlayan yıldız paterni

**25.** Fiziksel ürtikerler içinde lezyonların gerilemesi 24 saatten uzun sürebilen tipini işaretleyiniz.

*Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 3)*

- A)** Adrenerjik ürtiker
- B)** Akuajenik ürtiker
- C)** Gecikmiş basınç ürtikeri
- D)** Kolinergik ürtiker
- E)** Dermografizm

26. Kaşıntı ve ürtika plaklarının eşlik etmediği kronik anjiödemli hastada hangi tetkik yapılmalıdır?

*Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 2)*

- A) CRP
- B) RF
- C) TSH
- D) ANA
- E) C4

27. Kol ve bacaklarda keskin sınırlı eritemli annuler plakları olan bir hastadan alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde palisadlanma gösteren granulom yapısı, kollajen dejeneasyonu ve musin depozisyonu izlenmektedir. En olası tanı nedir?

*Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Kutanöz sarkoidoz
- B) Granulama annulare
- C) Eritema annulare sentrifigum
- D) Eritema marginatum
- E) Nekrobiyozis lipoidika

28. Pyoderma gangrenosum tedavisinde yeri olmayan seçeneği işaretleyiniz.

*Eritem ve ürtiker (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Siklosporin
- B) Etanersept
- C) Siklofosfamid
- D) İnterferon alfa
- E) Mikofenolat mofetil

29. Eritema ab igne'nin oluş nedenini açıklayan ifadeyi işaretleyiniz.

*Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Güneşte korunmasız uzun süre kalma sonucu oluşur.
- B) Yanığa neden olmadan uzun süre ısıya maruz kalma sonucu oluşur.
- C) Uzun süreli düşük şiddette soğuğa maruz kalma sonucu oluşur.
- D) Dar giysilerin sürtünmesine bağlı ısı artışı en büyük nedendir.
- E) Güneşin uzun vadede deride oluşturduğu retiküler yapıda bir pigmentasyondur.

30. Meibrowsky fenomeni nedir?

*Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Güneş maruziyeti ile derinin kolayca yanıp hiç bronzlaşmaması
- B) Güneş yanığından sonra gelişen soyulma ve deskuamasyon
- C) Güneş yanığı ile birlikte görülebilen ateş, titreme, bulantı, taşikardi
- D) Güneş maruziyeti ile gelişen erken pigmentasyon gelişimi
- E) Güneş maruziyeti ile gelişen geç melanogenezis

31. Pernio için **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

*Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Soğuk, nemli koşullar önemli risk faktörüdür
- B) Mavi-lividi renkli makül, papül ve nodüller ile karakterizedir
- C) Histopatolojide histiyositik hücre infiltrasyonu predominanttır
- D) Genç hastalarda spontan iyileşir, yaşlı hastalarda ise kronikleşebilir
- E) Tedavisinde nifedipin kullanılır

32. Ebstein Barr virüs hangi fotodermatozun kutanöz lezyonlarında saptanır?

*Fiziksel faktörlerle olan dermatozlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Aktinik prurigo
- B) Aktinik retiküloid
- C) Hidroa vaksiniforme
- D) Juvenil bahar erupsiyonu
- E) Polimorf ışık erupsiyonu

33. Ağız boşluğunun normal florasında bulunan, yanak ve çene altı bölgede indure nodül veya plağa neden olarak yüze açılan sinüsler ve sülfür granülleri içeren iltihabi akıntı ile karakterize olan hastalık hangisidir?

*Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Nokardiyoz
- B) Aktinomikoz
- C) Koksidiyoidomikoz
- D) Blastomikoz
- E) Histoplazmoz

34. Kronik mukokutanöz kandidiazis için **yanlış olan** seçeneği işaretleyiniz.



*Fungus ve mayalara baęlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Granüloamatöz lezyonlar sık gözlenir
- B) IL-12 üretimi yetersizdir
- C) IL-6 ve IL-10 seviyeleri artmıştır
- D) Tipik olarak hastalık 6 yaşından sonra ortaya çıkar
- E) Hereditör veya sporadik olarak ortaya çıkabilir

35. Pityriasis versikolor düşündüğünüz bir hastanın tedavisi için hangi majistral daha uygundur?

*Fungus ve mayalara baęlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Eau Borique
- B) Katran - Vazelin
- C) Salisilik asit - Gliserin
- D) Propilen glikol - Su
- E) Etil alkol - Su

36. Darier Hastalığı ile ilgili **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

*Genodermatozlar ve konjenital anormallikler (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Darier Hastalığı otozomal dominant kalıtmıli geçiş gösteren bir hastalıktır.
- B) Darier hastalarında tırnaklarda " V" şeklinde çentiklenme görülebilir.
- C) Patogeneğinde ATP2C1 mutasyonu tanımlanmıştır.
- D) Histopatolojisinde eozinofilik diskeratotik hücreler görülür.
- E) Deri ve mukozaları tutan bir keratinizasyon bozukluęudur.

37. Hereditör epidermolizis bülloza tipleri ve kusurlu proteinlerle ilgili eşleştirmelerden **yanlış** olanı işaretleyiniz?

*Genodermatozlar ve konjenital anormallikler (Zorluk derecesi: 5)*

- A) Distrofik epidermolizis bülloza-Tip XVII kollajen
- B) Epidermolizis bülloza simpleks-Keratin 5 ve 14
- C) Junctional epidermolizis bülloza-Laminin 332
- D) Musküler distrofiyle ilişkili epidermolizis bülloza simpleks-Plektin
- E) Pilorik atreziyle ilişkili junctional epidermolizis bülloza-alfa6 beta4 integrin

38. Konjenital iktiyozis, ilerleyici spastik paraparezi veya kuadriparezi ve mental retardasyon triadiyla karakterize; yağ asidi aldehid dehidrogenaz enzimi eksikliği sonucu gelişen, otozomal resesif geçişli hastalık hangisidir?

*Genodermatozlar ve konjenital anormallikler (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Chanarin-Dorfman sendromu
- B) Refsum hastalığı
- C) Sjögren-Larsson Sendromu
- D) CHILD sendromu
- E) Conradi- Hünemann- Happle Sendromu

39. HIV + hastalarda sık görülen ve bu enfeksiyonun bulgusu olabilen onikomikoz tipi hangisidir?

*Fungus ve mayalara bağlı hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Distal subungual
- B) Total distrofik
- C) Kandidal
- D) Beyaz süperfisiyel
- E) Proksimal subungual

40. Dermatitis herpetiformis tanılı bir hastanın hangi içeceği tüketmesi uygun değildir?

*Kronik büllöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Limonata
- B) Kolalı içecekler
- C) Süt
- D) Ayran
- E) Boza

41. 65 yaşında erkek hasta alt dudakta erozyon ile başvurdu. Öyküsünde şikayetlerinin 4 ay önce çıktığı ve bu süre içerisinde 6 kilo verdiğini belirtti. Muayenede dudaktaki lezyon dışında ekstremitelerinde likenoid papüller ve eritema multiforme benzeri lezyonlar saptadınız. Bu hasta için aşağıdaki ELISA testlerinden hangisini istemek en doğrudur?

*Kronik büllöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Envoplakin
- B) Transglutaminaz IgA
- C) BP180
- D) Endomisyum
- E) ANA

42. iner IgA büllöz dermatozunda en uygun tedavi seçeneğini işaretleyiniz.

*Kronik b ll  hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Dapson
- B) Sistemik kortikosteroid
- C) Azatioprin
- D) IVIG
- E) Siklosporin

43. Lazer epilasyonda kullanılmayan lazeri işaretleyiniz.

*Lazer cerrahisi ve kozmetik dermatoloji (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Ruby lazer
- B) Diode lazer
- C) CO2 lazer
- D) Alexandrite lazer
- E) Nd:Yag lazer

44. Deri yaşlanmasıyla ilgili yanlış ifadeyi işaretleyiniz.

*Lazer cerrahisi ve kozmetik dermatoloji (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Yaşlanan deride dermoepidermal bileşke zayıflar ve b l oluşumu meydana gelir.
- B) Melanositler sayıca azalır ve keratinositlere pigment transferinde bozulma meydana gelir.
- C) Keratinositlerdeki melanozomların heterojen dağılımına baėlı lentigo insidansı artar.
- D) Melanositik nevus sayısında ve seboreik keratoz sayısında artma meydana gelir.
- E) Epidermiste flagrin yapımında azalma olur.

45. Çocukluk dönemi sarkoidozunda gör len      klinik bulguyu (triad) işaretleyiniz?

*Makrofaj ve monosit hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Artrit +  veit + Kutan z bulgular
- B) Artrit +  veit + Periferik Lenfadenopati
- C) Eritema Nodosum +  veit + Periferik Lenfadenopati
- D) Kutan z bulgular + Periferik Lenfadenopati + Hiperkalsemi
- E) Artrit + Hiperkalsemi + Periferik Lenfadenopati

46. Melanom i in risk fakt r  olmayan se eneėi işaretleyiniz.

*Melanositik nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Dev konjenital nev slerin olması

- B) Yoğun çillenme olması
- C) Ailede melanom öyküsü
- D) Klinik ve histopatolojik olarak atipik nevüslerin olması
- E) COL7A1 gen mutasyonlarının varlığı

47. Konjenital melanositik nevus için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

*Melanositik nevus ve neoplaziler (Zorluk derecesi: 2)*

- A) İntraepidermal ve/veya dermal yerleşebilen benign melanositik proliferasyonlardır.
- B) Doğumdan sonraki 2 yıl içinde gelişen nevuslara konjenital tardif nevus denir.
- C) Dev konjenital nevuse satellit nevuslar eşlik eder.
- D) Çapı 1,5 cm den küçük olanlara küçük konjenital nevus denir.
- E) Çapı 10 cm nin üzerinde olanlar melanoma dönüşürler.

48. Tüberküloidler ile ilgili olarak **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

*Mikobakteriyal hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) M. tuberculosis veya antijenlerinin hematojen yolla yayılımıyla gelişirler
- B) M. tuberculosis'e karşı yeterli hücresel immun yanıtı olmayan kişilerde ortaya çıkar
- C) BCG aşısının bir komplikasyonu olarak ortaya çıkabilir
- D) Lezyonlarda PCR ile M. tuberculosis DNA sı gösterilebilir
- E) En sık papülonekrotik tüberkülid görülür

49. Lökoplazi ile ilgili ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

*Müköz membran hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Mukozaya yapışık beyaz kalınlaşmalardır.
- B) Oral kıllı formu sıklıkla sifilizle birlikte görülür.
- C) %10-20 premalign olabilir.
- D) Sigara kullanımı dudak lezyonlarında etkili olabilir.
- E) Karsinomaya dönüşüm 1-20 yılı bulabilir.

50. En sık oral ülser nedeni olan seçeneği işaretleyiniz.

*Müköz membran hastalıkları (Zorluk derecesi: 1)*

- A) Behçet hastalığı
- B) Eozinofilik ülser
- C) Rekürren aftöz stomatit

- D) Wegener granulomatozu
- E) Skuamöz hücreli karsinom

51. Kutanöz Leishmaniasis tanısında en sensitiv test hangisidir?

*Parazitik hastalıklar, ısırık ve sokmalar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Yaymada parazit aranması
- B) Biyopsidenkültür
- C) Doku sıvısından kültür
- D) Kan kültürü
- E) Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)

52. Vitiligo ile ilgili ifadelerden **yanlış** olanı işaretleyiniz.

*Pigmentasyon bozuklukları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Akkız bir pigment anomalisidir
- B) Olguların yaklaşık yarısı 20 yaşından önce başlar
- C) Melanositlerde hipoaktivite ve kısmi kayıp vardır
- D) Histolojik olarak genellikle inflamatuvar infiltrasyon yoktur
- E) En sık jeneralize patern görülür

53. Waardenburg sendromunun klinik bulgularından **olmayan** seçeneği işaretleyin?

*Pigmentasyon bozuklukları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Saçlarda beyaz perçem
- B) İriste hiperkromi
- C) Sağırılık
- D) Medial kaş hiperplazisi
- E) Pakionişi

54. Melazma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

*Pigmentasyon bozuklukları (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Koyu deri fototipine sahip kadınlarda daha sıktır
- B) Hidrokinon pigmentasyon yapabilir
- C) Oral kontraseptifler melazmayı alevlendirir.
- D) Lezyonlar yüz dışında ön kolda da izlenebilir
- E) Gebelikte ortaya çıktığında doğum sonrası nadiren düzelir

55. Liken planus tedavisinde kullanılmayanı işaretleyiniz.

*Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Oral metranidazol
- B) Oral tetrasiklin
- C) Asiklovir
- D) Dar band UVB
- E) Sulfasalazin

56. Hangisi likenoid ilaç döküntüsünün özelliği değildir?

*Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) 60 yaş üzeri görülmesi
- B) Wickham çizgilerinin yokluğu
- C) Kalıcı olabilen hiperpigmentasyon
- D) Bazen güneş gören bölgelerde tutulum
- E) Mukozalarda yaygın tutulum

57. Düşük fenil alanin seviyesi içeren diyetlerin verilmesi gereken kalıtsal palmoplantar keratoderma tipi hangisidir?

*Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Huriez sendromu
- B) Vohwinkel sendromu
- C) Richer-Hanhart sendromu
- D) Naxos sendromu
- E) Camisa sendromu

58. Parmaklarda skleroderma benzeri değişimler hangi tip pitriyazis rubra pilaris (PRP) formunda görülür ?

*Pitriyazis rozea, pitriyazis rubra pilaris ve diğer papüloskuamöz hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Klasik erişkin
- B) Klasik juvenil
- C) Juvenil sınırlı
- D) AIDS ile ilişkili
- E) Atipik erişkin

59. Bir günlük yenidoğan bebek eritrodermi nedeniyle değerlendirildiğinde kaş ve kirpiklerinin olmadığı, her iki göz kapağında yapışıklıklar saptandığı, yarık damak ve dudak olduğu belirtilmektedir. Ek olarak saçlı deri, gövde ve kasıklarda erode alanlar saptandığında aşağıdakilerden hangisini öncelikle düşünülür?

*Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 5)*

- A) Stafilokoksik Haşlanmış Deri Sendromu
- B) Büllöz konjenital iktiyoziform eritroderma
- C) Diffüz kutanöz mastositoz
- D) Hay-Wells Sendromu
- E) Omenn Sendromu

60. İnfantil akropüstüloz lezyonlarından hazırlanan sürüntü materyalinde hangisinin görülmesi beklenir?

*Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Nötrofil, nadiren eozinofil varlığı; bakteri veya fungal eleman yokluğu
- B) Eozinofil, nadiren nötrofil varlığı; bakteri veya fungal eleman yokluğu
- C) Nötrofil, nadiren eozinofiller ve bakteri veya fungal elemanların varlığı
- D) Eozinofil, nadiren nötrofiller ve bakteri veya fungal elemanların varlığı
- E) Bakteri veya fungal elemanların varlığı; nötrofil ve eozinofil yokluğu

61. Aşağıdaki alopesilerden hangisinde histopatolojik olarak; normal kıl folikül sayısı, terminal anajen kıl foliküllerinde peribulbar mononükleer hücre infiltrasyonu, artmış terminal katajen ve telojen oranı beklenir?

*Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Trikotillomani
- B) Androgenetik alopesi
- C) Alopesi areata
- D) Telojen efluvium
- E) Traksiyonel alopesi

62. Laboratuvar değerlendirmesinde testesteron 100-200 ng/dl, serbest testesteron aşırı yüksek, dehidroepiandrosteron sülfat (DHEA-S) normal, seks hormon bağlayan globülin (SHBG) düşük, LH yüksek, FSH düşük, LH/FSH>3 olarak tespit edilmesi durumunda hangisi düşünülür?

*Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Cushing Sendromu
- B) Polikistik Over Sendromu

- C) Adrenal tümör
- D) Yapısal hirsutizm
- E) Over tümörü

63. Pili torti, moniletrijs ve trikoreksis nodoza gibi yapısal saç anomalilerinin eşlik ettiđi, yaşamın ilk 5 ayında beliren fildişi renkte saçlar ile karakterize, X'e bađlı resesif kalıtım gösteren, konvulsif nöbetler ile seyirli genodermatoz hangisidir?

*Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 5)*

- A) Netherton Sendromu
- B) Naxos Hastalığı
- C) Menkes Hastalığı
- D) Crandall Sendromu
- E) Björnstad Sendromu

64. Tırnağın en sık görülen malign tümörü hangisidir?

*Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Melanoma
- B) Keratoakantoma
- C) Bowen Hastalığı
- D) Skuamöz hücreli karsinom
- E) Verrüköz karsinoma

65. Sistemik olarak kullanılan antiviral ilaçlardan hangisinde nefrotoksisite açısından risk yoktur?

*Viral enfeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Asiklovir
- B) Valasiklovir
- C) Famsiklovir
- D) Foskarnet
- E) Brivudin

66. Akne ile ilgili olarak doğru ifadeyi işaretleyiniz.

*Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Puberte öncesi komedonal aknesi olan çocuklarda DHEAS seviyelerinde artış görülebilir
- B) Akneli kadın hastalarda sebum salınımını baskılamak için düşük dozlarda östrojen yeterlidir
- C) Aknede propionobacterium acnes sayısı klinik şiddet ile korelidir



- D) Komedonal akne skar bırakmadan iyileşir
- E) Genetik faktörler akne etyopatogenezinde rol oynamaz

67. Terleme ile ilgili **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

*Yağ ve ter bezlerinin hastalıkları (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Aksiller hiperhidroz uykuda belirgin şekilde azalır.
- B) Aksiller hiperhidroz tiroid hastalığı veya diyabet gibi sistemik bir hastalıkla ilişkilidir.
- C) Gustator terleme diyabet hastalarında otonomik nöropati sonucu olabilir.
- D) Korda timpaniyi içeren zedelenmeleri takiben submental gustator terleme olabilir
- E) Gustator hiperhidroz otonomik sinir sistemini etkileyen patolojik durumlarda görülebilir.

68. Şiddetli-ilerlemiş psoriasis formlarında hangi ilaç kombinasyonu **önerilmez**?

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Metotreksat+infliksimab
- B) Siklosporin+PUVA
- C) Metotreksat + asitretin
- D) Asitretin+PUVA
- E) Asitretin+UVB

69. Penisilinin intramüsküler injeksiyonu sırasında ilacın artere girmesi veya irrite ederek arteriyospazma neden olması sonucu distal iskemik nekroz oluşmasına ne ad verilir?

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Hoigne Sendromu
- B) Jarish Herxheimer reaksiyonu
- C) Hutchinson reaksiyonu
- D) Nicolau Sendromu
- E) Frei Sendromu

70. Trikodisplazia spinuloza'ya neden olan ilacı işaretleyiniz.

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Takrolimus
- B) Hidroksiüre
- C) Siklofosfamid
- D) Methotreksat

**E)** Siklosporin

**71.** Castellani boyası ile ilgili yanlış seçeneği işaretleyiniz?

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 5)*

- A) Antibakteriyeldir
- B) Anestezikdir
- C) Fungusitdir
- D) Fenol içerir
- E)** İrritasyon yapmaz

**72.** Benzoil peroksit için yanlış olan seçeneği işaretleyiniz?

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Antibakteryel etkisi vardır
- B) Yara iyileştirici özelliğe sahiptir
- C) Keratolitik etkilidir
- D) %2.5-10 konsantrasyonda kullanılır
- E)** Alerjik kontakt dermatit riski taşır

**73.** Gebelikte kullanılan ilacın C kategorisinde olması ne anlama gelir?

*Topikal ve sistemik tedaviler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Hayvan çalışmalarında fetal risk olmadığı gösterilmiştir.
- B) Hayvan çalışmalarında risk ile ilgili veriler yetersizdir.
- C) İnsan çalışmalarında ciddi risk olduğu gösterilmiştir.
- D) İnsan çalışmalarında risk olmadığı gösterilmiştir.
- E)** İnsan çalışmaları eksik olup hayvanda fetal risk gösterilmiştir.

**74.** Otuz sekiz yaşındaki bayan hastada sadece sağ el 3.parmak tırnağında kalınlaşma, uzunlamasına sarı bandlar, tırnak plağının proksimalinde splinter hemorajiler tespit edildi. Kavisli bir şekil almış olan tırnağın kalınlaşmış bölgesinin önden görüntüsünün delikli yapıda olduğu fark edildi. Bu hastada olası tanı nedir?

*Saç ve tırnak hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Subungual ekzositoz
- B)** Onikomatrikoma
- C) Sarı tırnak sendromu
- D) Onikogrifoz

E) Onikokriptoz

75. Miliümlar için doğru tanımlama hangisidir?

*Diğerleri (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Boyutları yaklaşık 1-2 cm arasında değişen, sık gözlenen epidermoid kistlerdir
- B) Yenidoğan döneminde gözlenen miliümlar çoğunlukla ilk yılda kendiliğinden geriler
- C) Kist içeriği keratin, kıl ve granülasyon dokusundan oluşur
- D) Miliümlar primer oluşabileceği gibi sekonder de oluşabilir
- E) Miliümların tedavisinde tek seçenek total ekسیونdur

76. Ramsey Hunt Sendromu'nda görölmeyen durumu işaretleyiniz?

*Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) Fasyal sinir paralizisi
- B) Tat duyusu kaybı
- C) İşitme kaybı
- D) Kuru ağız
- E) Göz ağrısı

77. Mozaik verruka terimi hangi lokalizasyondaki verrukaları tanımlar?

*Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 1)*

- A) Periungual
- B) Diz ve dirsek lokalizasyonlu olanları
- C) Ağız köşelerine yerleşenleri
- D) Palmopantar lokalizasyonlu olanları
- E) Mukozal yerleşenleri

78. Gianotti-Crosti sendromu için karakteristik veya tanı kriteri olmayan klinik özelliği işaretleyiniz.

*Viral infeksiyonlar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Monomorfik, düz yüzeyle, pembe-kahverengi, papül veya papüloveziküller
- B) Yüz, glutealar, ön kol veya alt ekstremitte ekstansör yüzeylelerinde yerleşim
- C) Lezyonlarda simetrik dağılım ve Koebner fenomeni pozitifliği
- D) Oral ve genital mukozada lokalize peteşiyal lezyonlar
- E) En az 10 gün süren klinik tablo

79. Hangisi "Mikozis fungoides"de kötü prognozu ışaret etmez?

*Kutanöz lenfoid hiperplazi, lenfomalar (Zorluk derecesi: 4)*

- A) İleri evre
- B) Büyük hücre transformasyonu
- C) Lenf nodu tutulumu
- D) CD8 pozitifliği**
- E) CD30 pozitifliği

80. Geçirilmiş serebrovasküler öyküsü olan bir hastada bacaklarda livedo retikularis benzeri lezyonlar ve telenjektazik yamalar görülmüştür.

Ayırıcı tanıda hangi tip lenfoma düşünülmelidir?

*Kutanöz lenfoid hiperplazi, lenfomalar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Primer kutanöz marjinal zon B hücre lenfoması
- B) Anjiyosentrik lenfoma
- C) İntravasküler büyük B hücre lenfoması**
- D) Diffüz büyük B hücre lenfoması-bacak tipi
- E) Primer kutanöz folikül merkez B hücre lenfoması

81. Stevens-Johnson sendromu (SJS) ve toksik epidermal nekroliz'in (TEN) değerlendirilmesinde kullanılan SCORTEN'de hangi parametre yoktur?

*İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) 40 yaş üstü olmak
- B) Serum kreatinin düzeyi (>10 mmol/l)**
- C) Kanseri veya hematolojik malignite varlığı
- D) Kalp hızı > 120 atım/dk
- E) Serum bikarbonat düzeyi (<20mmol /l)

82. Kamçılı hiperpigmentasyon hangisine bağlı gelişir?

*İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Bleomisin**
- B) İmatinib
- C) İnliksimab
- D) Hidroksiüre
- E) Klorokin

83. Eritema multiforme (EM) için **yanlış** olan seçeneği işaretleyiniz?

*İlaç reaksiyonları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) EM'nin toksik epidermal nekrolize ilerleme riski yoktur
- B) EM minor ile EM major ayırımı mukozal tutulum ve sistemik tutulumu göre yapılır
- C) EM'li olguların yaklaşık %50'sinde öncesinde herpes labialis öyküsü bulunur
- D) EM'daki hedef lezyonlar genellikle ekstremit distallerinde görülürler
- E) EM' de genellikle el ve ayaklarda ödem görülür

**84.** Klinik değerlendirmede arteriyel trombozu, laboratuvar incelemede ise anti-b2-glikoprotein I antikorları yüksek titrede pozitif saptanan olguda tanı nedir?

*Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Takayasu arteriti
- B) Behçet Hastalığı
- C) Kolesterol embolisi
- D) Buerger Hastalığı
- E) Antifosfolipid antikor sendromu

**85.** Jüvenil tip dermatomyozit için yanlış olanı işaretleyiniz.

*Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Deri lezyonları yetişkin forma benzer, ancak daha erken ortaya çıkar.
- B) Kansere insidansı yetişkin forma göre daha yüksektir
- C) Simetrik kas güçsüzlüğü görülür.
- D) Gastrointestinal sistem ve miyokardiyumu etkileyen vaskülit ile karakterizedir.
- E) Prognozu erişkinlere göre daha iyidir.

**86.** Miks konnektif doku hastalığında tanı koydurucu antikor işaretleyiniz.

*Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)*

- A) ANA
- B) Anti-Mi2
- C) Anti-SRP
- D) U1-RNP
- E) SCL-70

**87.** Sistemik sklerozda pulmoner hipertansiyon riskini göstermede hangi otoantikor en değerlidir?

*Konnektif doku hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Sentromer
- B) Antinükleer antikor
- C) Topoizomeraz
- D) RNA polimeraz
- E) Kolpostatin

88. Venöz yetmezliğe bağlı bacak ülserlerinin özellikleri arasında sayılmayan özelliği işaretleyiniz?

*Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 2)*

- A) Medial malleol bölgesinde görülmesi
- B) Lipodermatoskleroz
- C) İyi sınırlı ülser
- D) Varislerin eşlik etmesi
- E) Peteşinin görülmesi

89. Behçet hastalığı için yanlış ifadeyi işaretleyiniz.

*Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Erkek hastalarda perianal fissür ve fistül sık görülür
- B) Ekstragenital ülserler sıklıkla intertriginöz alanlarda izlenir
- C) Eritema nodozum benzeri lezyonların patolojisinde vaskülit saptanabilir
- D) Sweet benzeri lezyonlar nadir deri lezyonları arasındadır
- E) Paterji testi 20 gauge kalın iğne ile yapılır

90. Livedo vaskülit ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

*Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Çoğunlukla orta yaş erkeklerde görülür
- B) Olgularda genellikle venöz yetmezlik mevcuttur
- C) Histopatolojide nükleer fragmantasyon yoktur.
- D) Doppler inceleme yapılabilir
- E) Alevlenme dönemlerinde yatak istirahati önemlidir

91. Churg Strauss sendromu için yanlış ifadeyi işaretleyiniz.

*Kutanöz vasküler hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Sıklıkla orta yaşlarda başlar
- B) Erken dönemde alerjik astım şeklinde kendini gösterebilir

- C) Doku eozinofilisi izlenebilir
- D) Viseral organlar ve deride ekstrasvasküler granulomlar izlenir
- E) Sıklıkla antiproteinaz 3'e karşı ANCA pozitifliği vardır

92. Eritema nodozum tedavisinde kanıt değeri en yüksek olan sistemik ajan hangisidir?

*Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Kolşisin
- B) Dapson
- C) Prednizon
- D) Potasyum iyodür
- E) Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar

93. Ülser oluşumu **gözlenmeyen** pannikülit işaretleyiniz.

*Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk derecesi: 1)*

- A) Lupus eritematosus pannikülit
- B) Eritema induratum
- C) Alfa-1 antitripsin eksikliği pannikülit
- D) Eritema nodozum
- E) Pankreatik pannikülit

94. Hibernom ile ilgili **yanlış** ifadeyi işaretleyiniz.

*Subkutan yağ dokusu hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Kahverengi yağ dokusundan kaynaklanır
- B) Ortalama boyutu 10 cm
- C) En sık interskapüler alan, boyun ve kalçaya yerleşir
- D) Lipomlulara göre daha genç yaşta ortaya çıkar
- E) Hızlı büyüyen tümörlerdir

95. Necrobiosis lipoidika (NL) ile ilgili doğru ifadeyi işaretleyiniz.

*Endokrin, nutrisyonel ve metabolizma hastalıkları (Zorluk derecesi: 2)*

- A) NL üzerinden skuamöz hücreli karsinom gelişebilir
- B) Lezyonların tamamı tedavi edilmediği takdirde ülser olur
- C) NL lezyonunun sınırları belirsiz olup, palpasyonla yumuşaktır
- D) Orta kısmında telenjiyektaziler, ektatik damarlar görünmesi kötü prognoz işaretidir

E) NL lezyonlarına yüz, saçlı deri lokalizasyonlarında rastlanmaz

96. Aslan yüz görünümüne neden olmayan hastalığı işaretleyiniz.

*Endokrin, nutrisyonel ve metabolizma hastalıkları (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Skleromiksödem
- B) Lipoid proteinozis
- C) Leşmanyazis
- D) Sarkoidozis
- E) Miliyer tüberkülozis

97. Tuberosklerozda deri belirtilerinin yaşla birlikte ortaya çıkış sırası hangisidir?

*Genodermatozlar ve konjenital anormallikler (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Cafe-au lait lekesi-Fasyal angiofibrom-Hipopigmente makül
- B) Fasyal angiofibrom-Hipopigmente makül-Cafe-au lait lekesi
- C) Hipopigmente makül-fasyal angiofibrom-Periungual fibrom
- D) Periungual fibrom-Fasyal angiofibrom-Hipopigmente makül
- E) Shagreen yaması-hipopigmente makül-fasyal angiofibrom

98. Psoriasisin hangi klinik formunda foto(kemo)terapi tercih edilmez?

*Psoriasis, palmoplantar erüpsiyonlar, püstüler dermatitler ve eritrodermi (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Guttat psoriasis
- B) Püstüler psoriasis
- C) Saçlı deri psoriasis
- D) Kronik plak psoriasis
- E) Palmoplantar psoriasis

99. Boyunda kordon şeklinde skatrisler ve birbirine bağlı fistüller oluşturan deri tüberkülozu formu hangisidir?

*Mikobakteriyal hastalıklar (Zorluk derecesi: 3)*

- A) Tüberküloz primer kompleks
- B) Tüberküloz kutis verrukoza
- C) Miliyer tüberküloz
- D) Lupus vulgaris
- E) Skrofuloderma



**100.** Aşağıdaki hastalıkların hangisinde Wood ışığı muayenesi yardımcı tanı yöntemleri arasında yer alır?

*Tanısıl Girişimler (Zorluk derecesi: 1)*

- A) Sifilitik şankr
- B) Tinea versicolor**
- C) Büllöz pemfigoid
- D) Atopik dermatit
- E) Psoriazis